



ធនាគារកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គម្រោងដំណាំ ម័រ
(AVOCADO, AVOCATIER, AVOCAT)



គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ អ.រ.ឌី.បី, មករា ២០២២

ដំណាំប៉រ

ដំណាំឈើហូបផ្លែប៉រ (ភាសាបារាំង អាវូកាដេ Avocatier ឬ អាវូកាត់ Avocat) ឬ អាវូកាដូ (ភាសាអង់គ្លេស : Avocado) ជាផ្លែឈើមានកំណើតចេញពីអាមេរិកកណ្តាល ។

ប៉រ ជារុក្ខជាតិនៅក្នុងអម្បូរ Lauraceae ស្ថិតក្នុងអម្បូរជាមួយ ផ្កាចន្ទី, ក្រវាញ និង Bay laurel ។

ប៉រ ជាផ្លែឈើពាណិជ្ជកម្ម និងត្រូវបានដាំដុះនៅតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅទាំងពិភពលោក និងតំបន់ក្តៅមធ្យម។ ប៉រ មានផ្លែពណ៌បៃតងពេលទុំបន្ទាប់ពីប្រមូលផល។ ដើមប៉រអាចដាំដោយបណ្តុះគ្រាប់បាន និងអាចបង្កាត់ពូជគឺធ្វើតាមវិធីផ្សំមែក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងបរិមាណផល ។

ផ្លែប៉រខ្លី យើងមិនអាចទទួលទានបានទេ ព្រោះវាមានសារជាតិ Tannin ធ្វើឱ្យមានរសជាតិល្ងឹង ញ៉ាំច្រើននឹងធ្វើឱ្យឈឺក្បាល យើងអាចទទួលបានតែផ្លែទុំ ដោយទទួលទានស្រស់ៗ។

១-អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរាងកាយ:

- ជាតិប្រេងនៅក្នុងសាច់ប៉រ ជួយកាត់បន្ថយកម្រិត LDL-cholesterol ដែលជាកូឡេស្តេរ៉ូលមានផលប៉ះពាល់ចំពោះរាងកាយ និងបន្ថែមកម្រិត HDL-cholesterol នៅក្នុងឈាមដែលជាកូឡេស្តេរ៉ូលមានគុណសម្បត្តិល្អចំពោះរាងកាយ ។

- អាចបង្ការជំងឺបេះដូង
- អាចកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម អ្នកជំងឺនេះខ្ពស់គួរទទួលទានផ្លែប៉រ ។
- អាចជួយបញ្ចុះទម្ងន់ ព្រោះកាបូអ៊ីដ្រាតមានកម្រិតទាប និងដោយសារមានជាតិស្ករតិច ទើបអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចទទួលទានផ្លែប៉របានដែរ ។
- មានវីតាមីន A ដែលជាសារធាតុ Antioxidant ជួយការពារកោសិកាក្នុងរាងកាយពីសារធាតុពុលក្នុងខ្យល់ ទឹក និងចំណីអាហារ ហើយនិងជំនួយភ្នែក ។
- មានវីតាមីន B ជួយបង្ការជំងឺស្លឹកស្រពន់ និងជំងឺដំបៅមាត់ ។
- មានវីតាមីន C ជួយបង្ការជំងឺផ្តាសាយនិងឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញ ។
- ប៉រសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែ និងអាហារូបត្ថម្ភដែលចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយ មិនថាជាកាល់ស្យូម, ប្រូតេអ៊ីន, ផូស្វ័រ ដែលជួយកាត់បន្ថយកូឡេស្តេរ៉ូល ជាពិសេសហ្វូលីកជាអាហារសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដោយសារហ្វូលីកជាអាហារូបត្ថម្ភចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ ធំធាត់ និងបង្កើតជាលិការបស់ទារក ។
- និងអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសម្រស់ និងសុខភាពស្បែក, សក់...។ល។

២-លក្ខណៈតូចសាស្ត្រ និងវត្តសាស្ត្រ

បំរើជាដំណាំដែលងាយស្រួលនិងប្រភេទដីសោះកក្រោះ ដីស្អាតហួតហែង និងប្រភេទដីដែលរក្សាទុកជាតិ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខេត្តដែលសំបូរនិងនិយមដាំដំណាំបំរើមានខេត្តរតនៈគិរី និងមណ្ឌលគិរី។

បំរើអាចដាំបាននៅលើដីច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែសមស្របបំផុតគឺនៅលើដីក្រហមបាសាល់ និងនៅតំបន់ខ្ពង់រាប។ គេតែងដាំដើមបំរើនៅដើមរដូវវស្សាគឺចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ កក្កដា។

ដោយសារតែបំរើ ជាប្រភេទផ្លែឈើ ដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅលើទីផ្សារជាពិសេសបំរើខ្មែរកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយអាចយកកសិផលនេះមកកែច្នៃជាបង្អែម ផ្លែឈើពេញនិយម ងាយស្រួលលក់ មានតម្លៃខ្ពស់ ធ្វើឱ្យកសិករក្នុងស្រុកមានក្តីសង្ឃឹមនិងមមាញឹកក្នុងការពង្រីកដីដាំដុះបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។

ដើមបំរើ ៖

បំរើ មានដើមត្រង់ កម្ពស់អាចដល់ទៅ ១៨ម៉ែត្រ សំបកពណ៌ត្នោតខ្ចី ហើយគ្រើមដូចស្បែកក្រពើ មានស្លឹកបំរើមានពណ៌បៃតង ។ ផ្កាបំរើមានទំហំតូចៗពណ៌សព្រលំលឿង មាន ៦ ត្របកចេញជាកញ្ចុំពីចុងមែក ។

ផ្លែបំរើ ៖

ផ្លែបំរើមានរាងទ្រវែងឬមូល មានទាំងពូជសម្បកស្តើងនិងសម្បកក្រាស់ មានសាច់ម៉ដ្ឋ មានសម្បុរតាំងពីលឿងខ្ចីទៅដល់លឿងចាស់ គ្មានក្លិន មានគ្រាប់តែ ១ និងមានស្រោមស្រោបគ្រាប់ ។

ពូជបំរើ ៖ មានដូចជា៖ Bacon, Fuerte, Gwen, Hass, Pinkerton, Reed, Stewart, Zutano, 034

១. ពូជគូទ័រម៉ាឡា (Guatemala) មានផ្លែពណ៌បៃតង ក្បាលផ្លែគ្រើម គ្រាប់មានទំហំតូច រាងមូលសាច់ក្រាស់ សម្បុរជាតិប្រេង ស័ក្តិសមនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បង្អួរ ។

២. ពូជឥណ្ឌាខាងលិច (West Indian) សម្បុរករលោងរដើមមានពណ៌បៃតងព្រលំលឿង សាច់ក្រាស់ គ្រាប់នៅក្នុងស្រោមរលុង មានរសជាតិផ្អែមឡែមៗ មានជាតិប្រេងតិច ធន់នឹងអាកាសធាតុក្តៅ ។

៣. ពូជម៉ិកស៊ីកូ មានផ្លែតូចសម្បុរករលោងស្តើង ពេលចាស់មានពណ៌ស្វាយ ស្រោមស្រោបគ្រាប់ស្តើងនិងធំរលុង មានជាតិប្រេងច្រើន ធន់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានល្អ ។

៣. ផ្នែកដាំដុះ និងបរិមាណផលដំណាំបំរើ

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ នៅទូទាំងប្រទេស ដំណាំបំរើដាំដុះបាន ៖

ល រ	លក្ខណៈដាំដុះ	ផ្ទៃដីដាំដុះសរុប (ហិកតា)	ផ្ទៃដីដាំដុះទទួល ផលសរុប(ហិកតា)	ទិន្នផលជាមធ្យម (តោន/ហិកតា)	បរិមាណផលសរុប (តោន)
១					

១	លក្ខណៈគ្រួសារ	556	378	12.17	4,596
២	លក្ខណៈក្រុមហ៊ុន	0	0	0	0
	សរុប	556	379	12.17	4,596

៤. ការដាំដុះ និងរដូវកាល

៤-១)- ទីតាំងដាំដុះ

- ប៉រជាប្រភេទដំណាំងាយដាំសុំនឹងតំបន់ដីស្ងួត ដីខ្សោះជីវជាតិជាដើម គេអាចដាំដើមប៉របាននៅលើដីច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែសមស្របបំផុតគឺលើដីក្រហមបាសាល់ជិតប្រភពទឹក ដីមិនដក់ទឹក និងដីទួលជម្រាល។ កសិករនិយមដាំដុះដើមប៉រនៅដើមរដូវវស្សាចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែ កក្កដា។

៤-២)- ការរៀបចំដី

- ត្រូវពង្រាបដីឱ្យរាបស្មើ (ជីកប្រព័ន្ធរំដោះទឹក) បើតំបន់ដីទំនាបត្រូវលើករង ឬព្យួរគល់ឱ្យខ្ពស់។

៤-៣)- ការជ្រើសរើសពូជ

ពូជហាស (Hass) និងពូជប៉រផ្លែវែងជាពូជប៉រដែលមានសាច់រមួល គ្មានជាតិសរសៃក្នុងសាច់ដែលមិនបង្កអោយសាច់ប៉រប្រែពណ៌ក្រមៅពេលប៉ះទង្គិច សំបកមានលក្ខណៈរឹងក្រាស់ និងអាចរក្សាទុកបានយូរជាងប៉រដ៏ទៃទៀត ផ្លែមានក្លិនឈ្ងុយ និងមានតម្លៃថ្លៃនៅលើទីផ្សារ។



Avocado - 034



Pinketon

ការដាំដើមបំរមាសវិធីជាច្រើនយ៉ាងដូចជា ÷ ការបណ្តុះគ្រាប់ ការបំបៅមែក ការផ្សំដោយតមែកជាដើម។ល។ ការបណ្តុះគ្រាប់ និងការផ្សំមែកកសិករមិនសូវនិយមទេ គេនិយមតែការផ្សំដោយកាត់តមែកច្រើនជាងព្រោះវាមិនក្លាយ ឆាប់បានផល និងមានទិន្នផលខ្ពស់ (ដើមថ្មីមានបូសវែង តជាមួយមែកដែលឆាប់មានផ្លែ)។

ការជ្រើសរើសពូជ និងការសម្រាំងគ្រាប់÷

គ្រាប់បំរដែលត្រូវយកមកបណ្តុះគឺត្រូវតែជាគ្រាប់ទុំដោយធម្មជាតិ ។ គ្រាប់បំរទុំធម្មជាតិ ងាយស្រួលបណ្តុះ ងាយថែ មានរសជាតិល្អកម្រិតទាបហើយក៏ផ្តល់ផលច្រើនដែរ។ ករណីដែលកសិករមិនច្បាស់ថាគឺគ្រាប់បំរនោះទុំល្អ ស្មើទុំ ឬខ្ចីទេនោះ កសិករអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀត គឺយកគ្រាប់បំរទៅបកសម្បកចេញឱ្យអស់រួចដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល៣ថ្ងៃ។ ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃនេះ គេអាចប្តូរទឹក១ ឬ២ដង។ គ្រាប់បំរដែលល្អវានឹងលិច ឯគ្រាប់បំរដែលមិនល្អ វានឹងអណ្តែតឡើង ឬស្កុយ។ ដូច្នេះកសិករអាចជ្រើសយកគ្រាប់បំរអណ្តែត និងស្កុយនោះចេញ ប៉ុន្តែគ្រាប់បំរដែលស្កុយខ្លះ ក៏អាចអណ្តែតឡើង ដូចគ្រាប់មិនល្អដែរ។


ការបណ្តុះកូន ÷

នៅពេលបណ្តុះបំរ កសិករត្រូវកប់គ្រាប់បំរឱ្យលិចក្នុងដីតែពាក់កណ្តាលបានហើយ នៅពេលដំបូងៗត្រូវស្រោចទឹកដែលមានកម្រិត PH ៥ចុច តែម្តងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីផ្តល់សំណើមដល់គ្រាប់ពូជងាយដុះ និងឆាប់លូតលាស់។ ប៉ុន្តែបើអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង កសិករអាចស្រោចទឹកពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ការថែទាំកូនបំរ÷ រយៈពេលដែលបំរកំពុងលូតលាស់ រហូតដល់អាយុ៣ខែ កសិករត្រូវតាមដាន និងថែទាំតាមសម្រួល ដើម្បីឱ្យកូនបំរលូតលាស់តាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វា។ ការតាមដានការលូតលាស់ គឺដើម្បី ចៀងវាងកុំឱ្យមានមេរោគឆ្លង និងបញ្ហានានាលើកូនបំរទាំងនោះ។

៤-៤)-ការដាំដុះ

- ការដាំដើមបំរអាចដាំបានពីចន្លោះគុម្ពនីមួយៗ ពី ៥ម x ៥ម ឬរហូតដល់ ៨ម ឬ ៩ម
- ជីករណ្តៅទំហំ ០.៥ម x ០.៥០ម x ០.៥០ម ឬអាចធំជាងនេះក៏បាន



- សម្អាតស្មៅនៅជុំវិញគល់ឱ្យបានទៀងទាត់
- ដោតឈើជន្លង់ចងជ្រោបនិងកូនដើម និងការពារកំដៅថ្ងៃខ្លាំង
- រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពដំណាំឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

៤-៥)-ការប្រើប្រាស់ដី

- ដាក់ជីលាមកសត្វទ្រាប់បាត ចំនួន ១៥ ទៅ ២០គីឡូក្រាម និងដាក់បន្ថែមមេត័បែរជីវសាស្ត្រប្លូតាស្យូម ០,៥គក្រ និងរោយកំបោរពី ០,៣ ទៅ ០,៥គក្រ/រណ្តៅ។
- ដើមបំរនៅត្រូវដាក់ជីពី៤ទៅ ៥ដង/ឆ្នាំ។ បរិមាណដាក់ជីគឺអាស្រ័យទៅតាមអាយុកាលនៃដើម។
- នៅពេលដើមចាប់ផ្តើមចេញផ្នែកសិករត្រូវដាក់ជី កាល់លី (Kali) ខ្ពស់ជាងមុន។ បរិមាណដាក់ជីនឹងមានលុះនឹងនៅឆកនាំទី ៩ ទី១០។
- ចាំបាច់ត្រូវដាក់បន្ថែមកំបោរ និងជីសរីរាង្គបាញ់បន្ថែមនូវបណ្តាជីលើស្លឹកដូចជា÷ Alpha Super, Antonic ប្រើជី Grow More មុននិងក្រោយការដាក់ជីលើកទី៤។

កំណត់ចំណាំ÷ គោលការណ៍សំខាន់នៃការជំរុញឱ្យបំផុតផលទិន្នផលខ្ពស់

- ធ្វើឱ្យដីមានសុខភាពល្អ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដី និងថ្នាំពុលនិងប្រើប្រាស់ដីធម្មជាតិឱ្យបានច្រើន
- ដើមត្រូវមានសុខភាពល្អ គ្មានការប៉ះផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺផ្សេងៗ។
- ប្រើផ្សិតជីវសាស្ត្រ ទ្រីកូខែម៉ា ដើម្បីការពារ និងជម្រុញការលូតលាស់ កាន់ក្តិបបានច្រើន និងអាចបន្ថយការបំផ្លាញពីសត្វចង្រៃផ្សេងៗបាន។

៤-៦)-ការស្រោចទឹក និងផ្គត់ផ្គង់

- ដើមបំរត្រូវការទឹកក្នុងបរិមាណសមល្មម ប៉ុន្តែត្រូវស្រោចច្រើនដង។ គេអាចស្រោចទឹកពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃម្តងក្នុងរដូវប្រាំង គួបផ្សំនិងការផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនចាំបាច់ស្រោចទឹកជោតជាំនោះទេ។

៤-៧)-របៀបបង្ការជម្ងឺ និងការកំចាត់ជំងឺ

ដើមបំរតែងត្រូវរងនូវជម្ងឺមួយចំនួនដូចជា÷

- ជម្ងឺរលួយឬស÷ ដើមបំរមានជម្ងឺស្លឹកសោះអង្កើយ មែកងាប់បណ្តើរៗពីចុងដល់ដើម។ កត្រូវរកឱ្យឃើញទាន់ពេលវេលានូវស្លាកស្នាមស្តុយទាំងនោះនៅលើដើមហើយកោសចេញឱ្យស្អាតនិងលាប sulfate ស្ពាន់កំបោរខាប់។ នៅពេលដើមងាប់ត្រូវដុតកំទេចចោលដើម្បីកុំឱ្យជម្ងឺឆ្លងរាលដាល។

- ជម្ងឺស្លឹកស្រពោន÷ ស្លឹកស្លឹកងាប់ ចាំបាច់ត្រូវប្រើថ្នាំ Anvil, Daconil, Aliette ដើម្បីបង្ការជម្ងឺ។

៤-៨)-ការតាក់តែងមែក

- ក្រោយពេលដាំរយៈពេលចាប់ពី ១ដល់ ៣ឆ្នាំត្រូវធ្វើការតាក់តែងមែកជាប្រចាំ

- កាត់មែកដែលមិនល្អចេញ (មែកដុះទេរខ្លាំង មែកលូតលាស់មិនល្អ មែកគងលើគ្នា..)
- ក្រោយពេលកាត់មែកចេញហើយត្រូវយកកំបោរលាបស្នាមកាត់ដើម្បីការពារមេរោគឆ្លងបន្ទាប់ពីកាត់មែករួចត្រូវបំផ្លាញរុក្ខជាតិចង្រៃហើយជ្រុំដី និងដាក់ជីលាមកសត្វពី ១៥-៥០ គ.ក្រ/ដើម ។

៥)-ការប្រមូលផល តម្លៃ និងទីផ្សារលក់ផលិតផលផ្លែប៉េ

៥-១)-ការប្រមូលផល

- ប៉េអាចចាប់ផ្តើមឱ្យផលលើកដំបូង ពីអាយុ ៤ ទៅ៥ឆ្នាំឡើងទៅបន្ទាប់ពីដាំ និងអាចបន្តផ្តល់ផលបានរហូតដល់ ២០ ទៅ ២៥ឆ្នាំ
- ប៉េជាទូទៅអាចប្រមូលផលក្នុងចន្លោះខែ មិថុនា ដល់ ខែសីហា ឬយូរជាងនេះ
- ទិន្នផលចាប់ផ្តើមដំបូងពី ៣០ ទៅ ៧០គក្រ/ដើម (ដើមប៉េអាយុ ៤ឆ្នាំ-៥ឆ្នាំ)ដោយសារគេត្រូវកាត់ជម្រះក្តីបចោលខ្លះដើម្បីកុំឱ្យបាក់មែក។
- ទិន្នផលអាចចាប់ពី ៤០០គក្រ/ដើមនៅពេលដើមប៉េអាយុចាប់ពី ១០ឆ្នាំឡើងទៅ
- អាយុកាលអាចផ្តល់ផលបានគឺរហូតដល់ ២៥-៣០ឆ្នាំ (កូនប៉េដែលកាត់តមែក) ។

៥-២)-ទីផ្សារលក់ផលិតផល និងតម្លៃ

ទីផ្សារប៉េខ្មែរមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែអ្នកលក់មួយចំនួនបាននាំចូលផ្លែប៉េពីប្រទេសវៀតណាម និងថៃ ដែលភាគច្រើនពុំមានគុណភាពល្អ ប្រសិនបើយើងនៅតែបណ្តោយឱ្យផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងហូរចូលវាយលុកទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករច្រើនឬសហគមន៍ពេកវានឹងនាំឱ្យកសិករខាតបង់ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនព្រោះការផលិតប៉េនៅកម្ពុជាបានផ្តោតលើសុវត្ថិភាព និងគុណភាព។

ប្រសិនបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ទីផ្សារផលិតផលប៉េនោះទេវានឹងធ្វើកសិករបាក់ទឹកចិត្តដែលនាំឱ្យកសិករអាចនឹងបោះបង់ចោលអាជីពនេះ។កសិករយើងមិនទាន់អាចលក់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងតម្លៃដើមទាបបាននៅឡើយទេ ព្រោះតម្លៃដើមផលិតកម្មកសិកម្មខ្ពស់ហើយបច្ចេកទេសដាំក៏នៅមានកម្រិតផងដែរ។

សព្វថ្ងៃនេះមានឈ្មួញច្រើនណាស់ដែលចាំទទួលទិញទិន្នផលប៉េយកទៅលក់បន្ត តម្លៃបោះដុំចេញពីចំការនៅឆ្នាំនេះ គឺចន្លោះពី ៥,០០០រៀល ទៅ ៧,០០០រៀល/គីឡូក្រាមទៅឱ្យឈ្មួញកណ្តាល ហើយគេលក់បន្តបានប្រហែលពី៨,០០០រៀល ទៅ១០,០០០រៀល /គីឡូក្រាម ។ផលិតផលប៉េនៅឆ្នាំនេះអាចមានតិចជាងឆ្នាំមុន ព្រោះបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអំណោយផលដល់ការដាំដុះ។

ដំណាំប៉េចាប់ផ្តើមហូចផលពីឆ្នាំទី៤ ឡើងទៅហើយទិន្នផលនឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ រីឯផ្ទៃផ្ការបស់ប៉េចេញមកក្នុង១ឆ្នាំម្តង និងមានម្តងម្កាលចេញមក២ដង គេហៅថាចេញផ្ទៃខុសរដូវ ។

៦)-ផ្លូវដើមសម្រាប់ការដាំ និងការថែទាំដើមប្រាំបីខែ ១៨០ដើម/ហិកតា

(ករណីដាំចន្លោះដើម ៨ម x ៧ម និងមានដីចំការផ្ទាល់ខ្លួន)

(គិតជាបៀល)

	បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃឯកតា	ចំណាយសរុប	ចំនួន សារ រំលស់	ចំណាយកាត់ រំលស់
	I-ចំណាយលើការចាប់ផ្តើមដាំដំបូង						
	ចំណាយប្រែប្រួល				6,528,000		6,528,000
1	ថ្លៃភ្នំរាស់	ដង	3	250,000	750,000	1	750,000
2	ថ្លៃដីករណ្តៅ និងថ្លៃដាំ	រណ្តៅ	180	8,000	1,440,000	1	1,440,000
3	កូនប័រ	ដើម	180	12,000	2,160,000	1	2,160,000
4	ដីធម្មជាតិ ១៥គីឡូ/រណ្តៅ x ១៨០រណ្តៅ	គីឡូ	2,700	500	1,350,000	1	1,350,000
5	កំបោរស 0.5គីឡូ/រណ្តៅ	គីឡូ	90	1,200	108,000	1	108,000
6	ឈើជន្ទល់ និងរបាំងការពារខ្យល់ កំដៅ	ដើម	180	2,000	360,000	1	360,000
7	ថ្នាំសម្លាប់សត្វកណ្តៀរ ១គីឡូ/រណ្តៅ	គីឡូ	180	2,000	360,000	1	360,000
	ចំណាយមិនប្រែប្រួល				8,440,000		1,528,000
8	ប្រព័ន្ធទុយោទឹក (ប្រើប្រាស់ ៥ឆ្នាំ)	កំប្លោក	1	1,600,000	1,600,000	5	320,000
9	ជីកស្រះ / អាងទឹក (ប្រើប្រាស់ ១០ឆ្នាំ)		1	2,800,000	2,800,000	10	280,000
10	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (រយៈពេលប្រើប្រាស់៥ឆ្នាំ)	កំប្លោក	1	3,280,000	3,280,000	5	656,000
11	ធុងបាញ់ថ្នាំ (រយៈពេលប្រើប្រាស់២ឆ្នាំ)		1	400,000	400,000	2	200,000
12	ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ (ប្រើប្រាស់ ៥ឆ្នាំ)		1	360,000	360,000	5	72,000
	subtotal I				14,968,000		8,056,000
	II-ចំណាយលើការថែទាំដាំដំបូង						
1	ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពាសៗ	ដង	4	100,000	400,000		400,000
2	ដីលាមកសត្វ៤ដង/ឆ្នាំ ម្តង២០គីឡូ/ដើម	កាវ៉ុង	600	3,000	1,800,000		1,800,000
3	ពលកម្មកាត់ស្មៅ កាត់៦ដង/ឆ្នាំ	នាក់ ដង	12	40,000	480,000		480,000
4	ប្រេងកាត់ស្មៅ ៥លីត្រ/ថ្ងៃx២ថ្ងៃx៦ដង	លីត្រ	60	3,200	192,000		192,000

5	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ស្រោចរយៈពេល៦ខែ១ខែ ស្រោច២ដង ម្តង ១០ល.=១២០ល.	លីត្រ	120	3,200	384,000		384,000
6	ចំណាយកាត់រំលស់ប្រចាំឆ្នាំ				1,528,000		1,528,000
	subtotal II				<u>4,784,000</u>		<u>4,784,000</u>
	III-ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី២ ដូចគ្នានឹងឆ្នាំទី១				<u>4,784,000</u>		<u>4,784,000</u>
	IV-ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី៣ ដូចគ្នានឹងឆ្នាំទី១				<u>4,784,000</u>		<u>4,784,000</u>
	V-ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី ៤ ជាឆ្នាំត្រូវ ប្រមូលផលជារបស់ស្ថាប័ន						
1	ចំណាយថែទាំប្រចាំឆ្នាំ				4,784,000		4,784,000
2	កម្លាំងពលកម្មប្រមូលផល	នាក់ ដើម	180	8,000	1,440,000		1,440,000
3	ចំណាយដឹកជញ្ជូនផល				1,000,000		1,000,000
	subtotal V				<u>7,224,000</u>	-	<u>7,224,000</u>
	VI-ចំណាយសរុបទាំងលើការដាំដុះ និង ការថែទាំដល់ឆ្នាំទី ៤				<u>36,544,000</u>	-	<u>29,632,000</u>
	VII-ចំណូលពីការប្រមូលផលស្រូវសី ១ នៅចុងឆ្នាំទី៤						
	ទិន្នផល 5០គ.ក/ដើម x 180 ដើម = 9,000គ.កកាត់ចេញ10% ផ្ទៃតូចមិនគ្រប់ ខ្នាត នៅសល់ 8,100 គក្រ		8,100	5,000	40,500,000		40,500,000
	VII-ចំណេញពីការលក់ផលស្រូវសី នៅចុងឆ្នាំទី៤				<u>3,956,000</u>	-	<u>10,868,000</u>

៧.ទិន្នផល៖ ទិន្នផលមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ១ដើមគឺអាចទទួលផលនៅឆ្នាំដំបូង បានចន្លោះពី៣០ ទៅ៧០គីឡូ និងអាចកើនឡើងដល់រាប់រយគីឡូក្រាមអាស្រ័យលើអាយុកាលនៃដើមប៉ុរ ។ ទិន្នផលអាចចាប់ពី ១០០គក្រ/ដើមឡើងទៅករណីដើមប៉ុរមានអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំឡើងទៅ ។

៨.តារាងសង្ខេប ចំណូល ចំណាយ លើការដាំដំណាំប៉េ

	បរិយាយ	ឯកតា	ចាប់ផ្តើម	ឆ្នាំទី១	ឆ្នាំទី២	ឆ្នាំទី៣	ឆ្នាំទី៤	ឆ្នាំទី៥	ឆ្នាំទី៦	ឆ្នាំទី៧	ឆ្នាំទី៨
1	ទិន្នផល/ដើម	គក្រ					50	75	100	125	150
2	ទិន្នផលសរុប	គក្រ					9,000	13,500	18,000	22,500	27,000
3	ចំណូលសរុប	លាន រៀល	-	-	-	-	45.00	67.50	90.00	112.50	135.00
4	ចំណាយសរុប	លាន រៀល	14.97	4.78	4.78	4.78	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
5	ចំណេញសរុប	លាន រៀល	(14.97)	(4.78)	(4.78)	(4.78)	37.78	60.28	82.78	105.28	127.78

សំគាល់៖ ករណីការកំណត់កំណើនទិន្នផលសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំថេរ និងតម្លៃលក់ថេរ ៥,០០០រៀល/ គក្រ

ករណីកសិករមានគំនិតក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមស្ថានភាពទីផ្សារ និងស្ថានភាពតម្រូវការដើម្បីកសាងនូវចង្វាក់តម្លៃដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង សហគ្រិនកសិករអាចដាំដំណាំរួមផ្សំមួយចំនួននៅតាមចន្លោះដើមប៉េ ដែលអាចទទួលបាននូវផលិតផលកសិកម្មដែលមានគុណភាពជាប់ជាប្រចាំហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា អាចបង្កើនសមត្ថភាពស្រូបយកនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម និងសម្រេចស្តង់ដារគុណភាពដែលទីផ្សារត្រូវការ។

៩.បញ្ហាប្រឈម

- ផលិតផលប៉េក្នុងស្រុកលក់ចេញមានតម្លៃថ្លៃជាងផ្ទៃប៉េនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង
- កសិករមួយចំនួនជាកសិករខ្នាតតូច ឬអ្នកដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារ ឬជាកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ ដែលពួកគាត់ធ្វើការដាំដុះទៅតាមការយល់ឃើញឬដាំតាមយថាភូត ដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមបច្ចេកទេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
- ការចំណាយវិនិយោគលើការដាំដុះ ថែទាំដំណាំប៉េមានតម្លៃខ្ពស់ និងពិបាកថែទាំ
- មានការក្លែងបន្លំផលិតផលដើម ធ្វើឱ្យអ្នកទិញបរិភោគបាត់ទំនុកចិត្តលើផលិតផលក្នុងស្រុក

១០.ដំណោះស្រាយ

ដាំដំណាំប៉េនៅកម្ពុជាគឺជាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងពេញនិយមដោយមានអតិថិជននៅក្នុងស្រុកជាច្រើនបានគាំទ្រទៅលើគុណភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផលកម្ពុជាដូចនេះកសិករដាំប៉េគួរតែអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃការដាំដំណាំតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបអាចទទួលបានទិន្នផលល្អប្រសើរ។ ប្រសិនបើកសិករដាំជា

លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំឬច្រើនគ្រួសារត្រូវមានការចងក្រងជាសហគមន៍កសិករដំណាំប្រាំងដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវជំនួយបច្ចេកទេសដាំដុះ ទុនឥណទានវិនិយោគ និងទីផ្សារលក់ផលិតផល។

ទោះបីជាដំណាំនេះអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្តី ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានការវិនិយោគទុនច្រើន និងទាមទារការអនុវត្តបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការថែទាំយ៉ាងដិតដល់ទើបទទួលបានជោគជ័យ។

ដោយដំណាំដើមឈើហូបផ្លែក្នុងស្រុកកំពុងតែមានសក្តានុពលទីផ្សារនៅកម្ពុជា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បាននិងកំពុងត្រៀមរៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចតទៅ៖

- រៀបចំផែនការ និងទិសដៅពង្រីកការដាំដំណាំឈើហូបផ្លែ ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ទីផ្សារក្នុង និងក្រៅប្រទេស។
- បង្កើតស្ថានីយបង្កាត់ និងផលិតពូជដំណាំហូបផ្លែដែលពេញនិយមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់កសិករដើម្បីងាយស្រួលដាក់លក់នៅលើផ្សារក្នុង និងក្រៅប្រទេស។
- អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាប្រចាំ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដំណាំប្រាំងនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងទៀត
- បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំដុះទំនើប រួមទាំងបច្ចេកទេសមុននិងក្រោយប្រមូលផលដល់អ្នកដាំដុះឱ្យស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព ឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការនាំចេញ។
- ចងក្រងសហគមន៍ផលិតដំណាំប្រាំង និងដំណាំហូបផ្លែដើម្បីជំរុញផលិតកម្មស្របតាមស្តង់ដារនិងតម្រូវការទីផ្សារ។
- លើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនក្នុងការបង្កើតការវិនិយោគ ដើម្បីជំរុញខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងជំរុញការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ជាពិសេសទុនឥណទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មដែលជាធនាគាររដ្ឋបម្រើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្ម។
- គួររៀបចំបង្កើតសហព័ន្ធកសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រ លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម និងកសិធុរកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

