



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK
ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមកន្ទាយ

Softshell Turtle Farming in Pond



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.ប៊ី)

ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣



023 220 811
023 220 810
012 847 387

#9-13, Street 7, Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh | info@ardb.com.kh | www.ardb.com.kh

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម	1
២-លក្ខណៈជីវិតសាស្ត្ររបស់កន្ទុយ	1
៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកន្ទុយ	3
៣.១. ការរៀបចំស្រះ.....	3
៣. ២. ការជ្រើសរើសកូនពូជ.....	3
៣. ៣. ដងស៊ីតេដាក់កូនពូជចិញ្ចឹម.....	4
៣. ៤. ការលែងកូនកន្ទុយពូជ.....	4
៣. ៥. ការផ្តល់ចំណី.....	4
៣. ៦. ការគ្រប់គ្រងស្រះ.....	5
៣. ៧. ការការពារ និងការព្យាបាលជំងឺ.....	5
៣. ៨. ការប្រមូលផល.....	6
៤-គម្រោងចំណាយលើការចិញ្ចឹមកន្ទុយក្នុងស្រះ	7
៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹមកន្ទុយសាច់.....	7
៤-២- ចំណាយលម្អិតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង.....	8
៤-៣- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹម១វគ្គ.....	8
៤-៤- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់.....	9
៥-ហានិភ័យ-បញ្ហាប្រឈម	10
៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	11
ប្រភពឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ	11

១-សេចក្តីផ្តើម

កន្ទាយ ជាវិសត្ថមួយប្រភេទ មានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យវិវប្បកម្ម មានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅលើទីផ្សារទាំងនៅក្នុងស្រុក និងសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។ ទោះបីកន្ទាយ ជាប្រភេទសត្វដែលត្រូវបានថែរក្សា ការពារ និងអភិរក្សយ៉ាងណាក៏ដោយ តែកន្ទាយចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងនៅតាមកសិដ្ឋានដែលមានលិខិតនិងច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការលក់ដូរបានជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនៅលើទីផ្សារ។ ការចិញ្ចឹមកន្ទាយតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារ បានធ្វើឱ្យវិវប្បកម្មវ័យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចិញ្ចឹមជាបន្តបន្ទាប់ និងបានក្លាយទៅជាមុខរបរថ្មីមួយតាមបែបពាណិជ្ជកម្ម បើធៀបនឹងមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបឬមុខរបរកសិកម្មផ្សេងទៀត។

អាជីវកម្មចិញ្ចឹមកន្ទាយ បាននាំកសិករមួយចំនួនមានកម្រិតជីវភាពធូរធារ ចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាកសិករនៅតាមជនបទ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាជីវកម្មនេះនៅមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងបរិមាណមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការទីផ្សារនៅឡើយ។ អាជីវកម្មចិញ្ចឹមកន្ទាយត្រូវបានអះអាងថាមានតម្រូវការទីផ្សារល្អទាំងប្រភេទកន្ទាយសាច់ និងកន្ទាយពូជ ដោយសារបណ្តាអាហារដ្ឋានក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនបានដាក់បញ្ចូលវាទៅជាមុខម្ហូបក្នុងហាង និងធ្វើការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ តម្រូវការទីផ្សារកន្ទាយសាច់ក្នុងមួយថ្ងៃមិនក្រោម ៤តោននោះទេ ក្នុងនោះ ៦០% ត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាង (របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មឆ្នាំ២០២០)។

ការចិញ្ចឹម និងការបង្កាត់ពូជកន្ទាយទទួលបានជោគជ័យ ត្រូវជ្រើសរើសពូជល្អៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមដែលអាចធ្វើឱ្យមានភាពធន់ទ្រាំនឹងជំងឺ ការបង្កើតលក្ខខណ្ឌស្រះចិញ្ចឹមឱ្យបានសមស្រប ការផ្តល់ចំណីត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ និងការថែទាំល្អ ធ្វើឱ្យកន្ទាយមានការលូតលាស់ ធំធាត់លឿន ដូចនេះ កសិករចាំបាច់ត្រូវមានការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

២-លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់កន្ទាយ

កន្ទាយ ជាប្រភេទសត្វទឹកសាបអាចរស់នៅក្នុងត្រពាំង ស្រះ បឹងឬរំពែក ប្រឡាយនានា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ កន្ទាយ ជាសត្វឈាមត្រជាក់ ស្ថិតក្នុងអម្បូរ Trionychidae ដែលបច្ចុប្បន្ន រួមមានបីប្រភេទសំខាន់ៗ និងកំពុងចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺកន្ទាយផ្កា (Trionyx Sinensis), កន្ទាយបន្ទា (Trionyx Steinachderi), និងកន្ទាយស្មៅ (Trionyx Cartilagineus) ។



កន្ទាយផ្កា (Trionyx Sinensis)



កន្ទាយបន្លា (*Trionyx Steinachderi*)



កន្ទាយស្មៅ (*Trionyx Cartilagineus*)

កន្ទាយចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹក ជាការរស់នៅលើគោក។ នៅលើគោក កន្ទាយអាចដកដង្ហើមតាមស្លូត ដែលតែងតែសង្កេតឃើញវាងើបក្បាលនៅលើផ្ទៃទឹកយូរៗម្តង និងដកដង្ហើមដោយស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនតាម រយៈស្បែកនៅពេលវាស់នៅក្នុងទឹក។ ទឹកក្នុងស្រះចិញ្ចឹមកន្ទាយត្រូវស្អាតមិនមានជាតិពុល ដោយមានកម្រិត pH សមស្របចន្លោះពី ៧-៨ និងសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី ២៥-៣០អង្សាសេ។ ពេលវេលាដែលកន្ទាយចូលចិត្ត បំផុតគឺពីរដូវរំហើយដល់រដូវក្តៅ ជាពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅ និងមានពន្លឺថ្ងៃ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជំរុញឱ្យឃ្លាន ស៊ីចំណីច្រើន លូតលាស់លឿន និងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំង ពេលខ្លះថែមទាំងដេញខាំគ្នាយ៉ាងសាហាវបណ្តាល ឱ្យរបួស និងហូរឈាមទៀតផង។ លក្ខណៈជីវសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលកសិករត្រូវយល់ដឹង មានដូចខាងក្រោម៖

❖ **ចរិតស៊ីចំណី៖** កន្ទាយជាប្រភេទសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ។ បន្ទាប់ពីញាស់បានមួយថ្ងៃ កន្ទាយចាប់ ផ្តើមចេះរកចំណីស៊ីខាងក្រៅបានដោយខ្លួនឯង។ នៅក្នុងធម្មជាតិ ចំណីសំខាន់ៗរបស់កន្ទាយមានដូចជា៖ ពពួកសត្វល្អិតប្លង់តុង ជន្លេន កូនត្រីល្អិត កំពឹស ក្តាម ខ្យង និងប្រភេទរុក្ខជាតិមួយចំនួន ។ល។ លក្ខខណ្ឌ ចិញ្ចឹមក្នុងស្រះ កន្ទាយអាចស៊ីចំណីផ្សំពីសាច់ កាកសំណល់ត្រី មាន់ ទា ដែលមានតម្លៃទាប និងចំណីគ្រាប់ ក្រុមហ៊ុន។



គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមកន្ទាយ

❖ **ការលូតលាស់**÷ កន្ទាយលូតលាស់អាស្រ័យលើប្រភេទពូជ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម និងលក្ខខណ្ឌ បរិស្ថានចិញ្ចឹម។ ករណីចិញ្ចឹមកូនពូជទំហំចន្លោះពី ១០០-២០០ក្រាម/ក្បាល ក្នុងរយៈពេលពី ៦-៨ខែ អាច មានទម្ងន់ចន្លោះពី ០.៨-១គ.ក/ក្បាល នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានសីតុណ្ហភាពប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពី ២៥-៣០អង្សាសេ តែបើសិនជាប្រកាម ២៥អង្សាសេឬលើសពី ៣២អង្សាសេ អាចបណ្តាលឱ្យកន្ទាយស៊ី ចំណីតិចឬមិនស៊ីចំណីតែម្តង និងមានការលូតលាស់ធំធាត់យឺត។

❖ **ការបន្តពូជ** ÷ កន្ទាយ មានទម្ងន់ចាប់ពី ០.៥-២គ.ក/ក្បាល ឡើងទៅ និងមានអាយុចាប់ពី២ឆ្នាំ ទើបអាចធ្វើការបន្តពូជបាន ហើយតែងតែធ្វើការបន្តពូជនៅរដូវវស្សា មានភ្លៀងធ្លាក់។ កន្ទាយ ជាប្រភេទ សត្វបន្តពូជខាងក្នុង នៅពេលយប់(ភាគច្រើន) តាមវាលខ្សាច់ឬភក់ប្រាំងទន្លេ អូរ ឬអាងទឹកដែលវាស់នៅ។ ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរដូវវស្សា កន្ទាយញឹកចាប់ផ្តើមម្នាក់ពងភ្លាមៗទៅក្នុងរណ្តៅ និងកាយលុបជិត ពីលើពង រយៈពេលពី ៥០-៦០ថ្ងៃ រហូតដល់ពេលញាស់ជាកូន។



៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកន្ទាយ

៣.១. ការរៀបចំស្រះ÷

- ស្រះគួរមានទំហំ ១០០ម៉ែត្រឡើង ជម្រៅ ១-២ម៉ែត្រ កម្រិតថ្លានៃទឹកប្រមាណ ៣០ស.ម
- ជ្រើសរើសទីតាំងស្ងប់ស្ងាត់ ជិតផ្ទះងាយស្រួលផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការពារ និងឱ្យចំណី រួចយកស័ង្កសី ឬសំណាញ់ព័ទ្ធជុំវិញ ចម្ងាយ១ម៉ែត្រពីមាត់ស្រះ ដើម្បីកុំឱ្យកន្ទាយឡើងចេញ។
- អាចដាំដើមដំណាំហូបផ្លែនៅតាមមាត់ស្រះ ដើម្បីជាម្ហូបដល់កន្ទាយ និងដាក់ដាំត្រកួន កំប្លោក កញ្ឆែតក្នុងស្រះផងដែរ។
- រៀបចំដាក់បន្ទះឬស្សីឬក្បាលរាងទេរបន្តិច ដើម្បីឱ្យកន្ទាយឡើងហាលថ្ងៃ និងស៊ីចំណី
- បាតស្រះត្រូវរក្សាភក់កម្រាស់ពី ១០-២០ស.ម និងបាចកំបោសពី ១-១.៥គ/១០០ម៉ែត្រ ទុកហាលថ្ងៃ ប្រមាណ២សប្តាហ៍ក្រោយមកបញ្ចូលទឹកជម្រៅពី០.៨-១ម៉ែត្រ និង១សប្តាហ៍ក្រោយទើបអាចលែងកូន កន្ទាយបាន។

៣.២. ការជ្រើសរើសកូនពូជ÷

គុណភាពកូនពូជ គឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកន្ទាយទទួលបានជោគជ័យ និងបានទិន្នផល ខ្ពស់។ កសិករត្រូវជ្រើសរើសកូនកន្ទាយពូជមានគុណភាពល្អ សម្រាប់ដាក់ចិញ្ចឹមស្របតាមគោលការណ៍ បច្ចេកទេស ដូចខាងក្រោម÷

- ជ្រើសរើសកូនពូជដែលមានកម្លាំងមាំមួន រូបរាងស្អាតល្អ មិនមានរបួសស្នាម មិនមានជំងឺ
- កូនពូជមានទម្ងន់ ១០០ក្រាម/ក្បាល ហើយមានទំហំប៉ុនៗគ្នាល្អ
- កូនពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់មកពីកសិដ្ឋានដែលមានការអនុញ្ញាត និងច្បាប់ត្រឹមត្រូវ

៣. ៣. ដង់ស៊ីតេដាក់កូនពូជចិញ្ចឹម៖

ចំនួនកូនកន្ទាយដាក់ចិញ្ចឹម អាស្រ័យលើដំណាក់កាលលូតលាស់ធំធាត់នៃកូនកន្ទាយពូជនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

- កូនកន្ទាយមានទម្ងន់ពី ៥០-១០០ក្រាម ដង់ស៊ីតេកូនកន្ទាយពូជត្រូវដាក់ពី១០-១៥ក្បាល/ម៉ែ^២។ កូនពូជដែលលូតលាស់លឿនមានទម្ងន់ពី១០០ក្រាមក្នុងមួយក្បាលឡើងទៅ។
- កូនកន្ទាយពូជទម្ងន់ប្រមាណ២០០ក្រាមត្រូវលែងតែ៤-៧ក្បាល/ម៉ែ^២។

៣. ៤. ការលែងកូនកន្ទាយពូជ៖

ត្រូវលែងកូនកន្ទាយក្នុងអាងឬសំណាញ់ប្រមាណ១សប្តាហ៍សិនមុននឹងដាក់ក្នុងស្រះ ដើម្បីពិនិត្យមើលកូនណាដែលមិនល្អយកចេញ។ មុនពេលលែងកូនកន្ទាយពូជចិញ្ចឹម ត្រូវធ្វើអនាម័យ សម្អាត កម្អាតចោលនូវរាល់មេរោគផ្សេងៗតោងជាប់លើដងខ្លួនកូនកន្ទាយ ដោយប្រើសូលុយស្យុងសូដ្យូមក្លរ ១០% ឬប្រើសូលុយស្យុងពែរម៉ង់កាណាត ១មីលីក្រាម/លីត្រទឹក រយៈពេល១០នាទី មុនពេលលែងកូនកន្ទាយចូលទៅក្នុងស្រះចិញ្ចឹម។

៣. ៥. ការផ្តល់ចំណី៖

បរិមាណចំណីប្រចាំថ្ងៃត្រូវផ្តល់ឱ្យកន្ទាយស៊ីចន្លោះពី ៥-៨% ធៀបនឹងទម្ងន់ដងខ្លួនសរុបកន្ទាយក្នុងស្រះ នៅពេលសីតុណ្ហភាព ២៥-២៩អង្សាសេ និងកាត់បន្ថយមកត្រឹម ៤-៥% នៅពេលសីតុណ្ហភាពពី ២០-២៥អង្សាសេ ដោយផ្តល់ចំណីចំនួន ២-៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេលមេឃត្រជាក់ល្អ ជាពិសេសពេលព្រឹក និងរសៀលត្រជាក់។ ចំណីផ្សំ និងស្រស់ត្រូវដាក់នៅលើបន្ទះក្តារនៅតាមមាត់ស្រះ ចំណែកចំណីគ្រាប់ អាចបាចផ្គាល់ទៅក្នុងស្រះ។

ប្រភេទចំណីសំខាន់ៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមកន្ទាយ រួមមានបីប្រភេទ រួមមាន៖

- **ប្រភេទចំណីគ្រាប់៖** ជាចំណីចេញពីរោងចក្រ មានសមាសធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការ និងមានប្រភេទអ៊ីនឌូស អាចធ្វើឱ្យកន្ទាយធំធាត់លឿន។
- **ប្រភេទចំណីផ្សំ៖** ជាប្រភេទចំណីដែលកសិករអាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋាន រួមមាន៖ ចុងអង្ករ សណ្តែកសៀង កន្ទក់ ដំឡូងជ្វា ពោត ម្សៅត្រី ត្រីជី ដោយលាយបញ្ចូលគ្នា រួចចម្អិនឱ្យឆ្អិនមុនពេលឱ្យកន្ទាយស៊ី។ ចំណីផ្សំគួរមានលាយវិធានព្រឹមិច និងសារធាតុជួយរំលាយអាហារ ដើម្បីជួយដល់ការលូតលាស់លឿន និងបង្ការជំងឺផ្សេងៗ។

-ប្រភេទចំណីស្រស់៖ មានដូចជា កូនត្រីល្អិត កំពឹស ក្តាម ខ្យង ជន្លេន សត្វល្អិត កាកសំណល់ផ្ទះបាយ រោងចក្រ និងកាកដំណល់សត្វឃាតដ្ឋាន។



៣.៦. ការគ្រប់គ្រងស្រះ៖

កន្ទាយ ជាសត្វដែលអាចរស់នៅក្នុងទឹក និងលើគោក ដូចនេះ អ្នកចិញ្ចឹមត្រូវតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ ជាប្រចាំនូវទំហំបង្កីស្រះ និងរបងព័ទ្ធជុំវិញកុំឱ្យផ្ទុះឆ្កាយអាចបណ្តាលឱ្យកូនកន្ទាយចេញក្រៅស្រះបាន។ ត្រូវ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទឹកចន្លោះពី ២០-៥០% ក្នុងរយៈពេលមួយឬពីរខែម្តង។ គួរបញ្ចៀសឱ្យបាននូវការបង្កសម្លេង ខ្លាំងៗដែលអាចប៉ះពាល់ដៅការរស់នៅ លូតលាស់ ធំធាត់ របស់កន្ទាយ។ រៀបចំលម្អមាត់ស្រះ ដោយដាំបន្លែ និងស្លឹកត្រៃនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃរបងឬរបាំង ដើម្បីឱ្យកន្ទាយឡើងទៅពងឬហាលថ្ងៃ។ ជៀសវាងផ្តល់ចំណី លើស សល់ច្រើនធ្លាក់ចូលទៅបាតស្រះបណ្តាលឱ្យឆាប់ខូចគុណភាពទឹក និងបង្កឱ្យកន្ទាយកើតជំងឺផ្សេងៗ និងមានការលូតលាស់យឺត។

៣.៧. ការការពារ និងការព្យាបាលជំងឺ៖

ដើម្បីបង្ការបាននូវជំងឺផ្សេងៗអាចកើតមានឡើងចំពោះកន្ទាយចិញ្ចឹម ត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការមួយ ចំនួនដូចជា៖ ការពិនិត្យគុណភាពទឹក និងការផ្លាស់ប្តូរទឹកត្រូវធ្វើជាប្រចាំ អាស្រ័យលើគុណភាពទឹកជាក់ស្តែង។ ការរៀបចំស្រះមុនពេលដាក់កូនកន្ទាយ ត្រូវរៀបចំសម្អាត សមស្របតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេស ដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់ពពួកមេរោគផ្សេងៗដែលអាចបង្កជំងឺដល់កូនកន្ទាយ។

ប្រភេទជំងឺតែងជួបប្រទះក្នុងការចិញ្ចឹមកន្ទាយ មានដូចជា៖

ក. ជំងឺហើមក៖ ធ្វើឱ្យកន្ទាយពិបាកស៊ីចំណី

វិធីព្យាបាល៖ ដោយប្រើប្រភេទថ្នាំ Clorocid/Sulfamid លាយជាមួយចំណីឱ្យកន្ទាយស៊ី សម្រាប់២ថ្ងៃដំបូង នូវកម្រិត ០.២ក្រាម/គ.កចំណី និងថ្ងៃបន្ទាប់មក លាយកម្រិតថ្នាំត្រឹមតែ០.១ ក្រាម/គ.កចំណី ឱ្យស៊ីរយៈពេល៣ថ្ងៃបន្តទៀត។

ខ. ជំងឺដំបៅលើដងខ្នង៖ បណ្តាលមកពីទឹកមានជាតិពុល បង្កឡើងពីកាកសំណល់ចំណី និងលាមក កន្ទាយនៅក្នុងស្រះ។ កសិករអាចសង្កេតឃើញ កន្ទាយ មានរលាកនៅលើក្បាល ក មាត់ និងជើង។ ករណីរលាកធ្ងន់ធ្ងរ អាចបង្កឱ្យមានខ្ទុះឈាម រីកម្រាមជើង ភ្នែកក្រហម និងកំលាំងខ្សោយ មិនសូវស៊ី ចំណី ហើយអាចងាប់បានក្នុងករណីព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលា។

វិធីព្យាបាល៖ កសិករអាចប្រើថ្នាំប្រភេទ Rifampicin លាយជាមួយខ្លាញ់ជ្រូកលាបលើកន្លែងដែលមានស្នាមរបួសរលាក ហើយរក្សាទុកនៅលើគោករយៈពេលពី ៣០-៦០នាទី ដើម្បីឱ្យថ្នាំស្រូបចូលទៅក្នុងស្បែកស្រស់រលាកដែលមានទឹកក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែកមួយ សម្រាប់ព្យាបាលបន្តដល់៧ថ្ងៃជាប់គ្នា ដោយថ្ងៃដំបូងប្រើថ្នាំ Rifampicin ១០០មីលីក្រាម/គ.កខ្លាញ់ជ្រូក និងពីថ្ងៃទី២ ដល់៧ ប្រើ៥០មីលីក្រាម/គ.កខ្លាញ់ជ្រូក។



គ. ជំងឺផ្សិត៖ ជាប្រភេទជំងឺសើស្បែក តែងកើតមានឡើងនៅលើក និងជើង មានពណ៌សអាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចងាប់បាន។ ជំងឺប្រភេទនេះតែងកើតមាននៅពេលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ និងក្នុងរដូវមានភ្លៀងធ្លាក់ នូវកម្រិតសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី ១៨-២៥ អង្សាសេ។

វិធីព្យាបាល៖ ដោយប្រើប្រភេទថ្នាំ TCCA 90% Chlorine ប៊ិរមាណ ១ក្រាម/ម^៣ ទឹកស្រះ ដោយបាចចូលទៅក្នុងទឹកស្រះចិញ្ចឹមកន្ទាយ។

(ការការពារ និងការព្យាបាលជំងឺ យោងតាមឯកសារបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកន្ទាយនៃក្រសួងកសិកម្ម)



៣.៨. ការប្រមូលផល៖

បន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបានរយៈពេល ១២ខែ កន្ទាយមានទម្ងន់ចន្លោះពី ០.៨-១.២គីឡូក្រាម/ក្បាល ដោយកសិករអាចចាប់ផ្តើមប្រមូលផលរំលស់កូនកន្ទាយដែលមានទម្ងន់ស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ ហើយរក្សាទុកកូនកន្ទាយដែលមានទំហំតូចៗចិញ្ចឹមបន្តឱ្យមានការលូតលាស់ធំធាត់លឿនជាងមុន។ ការប្រមូលផលសរុបនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រើសំណាញ់ និងបន្ទាប់មកបង្ហូរទឹកចេញអស់ពីស្រះប្រមូលចាប់កន្ទាយ។ កន្ទាយនីមួយៗ ត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងថង់ប្លាស្ទិកឬថង់សំណាញ់ បន្ទាប់មកយកដាក់

ក្នុងបារីបូជនស្នោ រក្សាឱ្យមានសំណើមជានិច្ច។ ការចាប់កន្ទាយ ត្រូវធ្វើឡើងដោយថ្មមៗ និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីជៀសវាងការបង្កឱ្យមានរបួសស្នាមដល់កន្ទាយ។



៤- គម្រោងចំណាយលើការចិញ្ចឹមកន្ទាយក្នុងស្រះ៖

៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹមកន្ទាយសាច់៖ (បទពិសោធន៍របស់កសិករនៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប)

- ទំហំស្រះ ÷ ៧៥០ ម^៣ (បណ្តោយ ២៥ម៉ែ ទទឹង ១៥ម៉ែ ជម្រៅ ២ម៉ែ)
- ចំនួនកូនកន្ទាយពូជ/វគ្គ ÷ ៣,០០០កូន (ដងស៊ីតេដាក់ចិញ្ចឹម ៨ក្បាល/ម៉ែ^២)
- ទម្ងន់កូនកន្ទាយ ÷ ចន្លោះពី ១០០-១៥០ក្រាម/ក្បាល
- ប្រភពកូនពូជ ÷ ផលិតក្នុងកសិដ្ឋានផ្ទាល់ (តម្លៃទីផ្សារ ៣៥០០-៤០០០៛/កូន)
- ចំនួនវគ្គចិញ្ចឹម/ឆ្នាំ ÷ ១វគ្គ/ឆ្នាំ
- រយៈពេលចិញ្ចឹម ÷ ១២ខែ/វគ្គ
- ចំណីផ្តល់ឱ្យកន្ទាយស៊ី ÷ ចំណីគ្រាប់ក្រុមហ៊ុន មានកម្រិតប្រូតេអ៊ីនពី ៣០-៤០% និងចំណីផ្សំ ឬចំណីស្រស់ ២ដង/សប្តាហ៍ ។
- អត្រាបាត់បង់ ÷ ១៥% (អាស្រ័យលើសុខភាពកូនពូជ និងការថែទាំ)
- ទិន្នផល ÷ ចន្លោះ ១,២៧៥-២,០៤០គ.ក/វគ្គ និងមធ្យម ១,៧៨៥គ.ក/វគ្គ
- ទីផ្សារ ÷ ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យឈ្មួញក្នុងខេត្តសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ ភ្នំពេញ និងខេត្តក្រចេះ (ឈ្មួញប្រចាំ) ។
- តម្លៃ ÷ ៤៨,០០០៛/គ.ក (លក់រាយ) និង ៣២,០០០៛/គ.ក(បោះដុំ)
- តម្រូវការទុន ÷ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ដោយរៀបចំជីកស្រះចិញ្ចឹម និងបំពាក់សម្ភារៈ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃដី) ត្រូវចំណាយដើមទុនប្រមាណ ២៤,៣៦៥,០០០រៀល ក្នុងនោះ៖

ទុនវិនិយោគសម្រាប់ដឹកស្រះ និងបំពាក់ សម្ភារៈ (រៀល)	ទុនសម្រាប់ដំណើរការចិញ្ចឹម កន្ទាយ (រៀល)	ទឹកប្រាក់សរុប (រៀល)
៥,៨៩០,០០០	១៨,៤៧៥,០០០	២៤,៣៦៥,០០០

៤-២- ចំណាយលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង៖

លរ	មុខចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃរាយ (រៀល)	តម្លៃសរុប (រៀល)
ចំណាយសរុប ក+ខ					24,365,000
ក-ការចំណាយប្រែប្រួល					18,475,000
1	កូនកន្ទាយពូជ	ក្បាល	3,000	4,000	12,000,000
2	ចំណីសម្រេច (ប្រូតេអ៊ីន ៣០-៤០%)	គ. ក	500	4,800	2,400,000
3	ចំណីផ្សំ និងស្រស់ (២ដង/ សប្តាហ៍)	គ. ក	720	2,000	1,440,000
4	កំបោរស	គ. ក	40	2,000	80,000
5	កម្លាំងពលកម្ម (3ម៉ោង x 30ថ្ងៃ x 12ខែ) ÷ 24ម៉ោង=45ថ្ងៃ	ថ្ងៃ	45	35,000	1,575,000
6	ថ្នាំកែទឹក/វគ្គចិញ្ចឹម	វគ្គ	1	260,000	260,000
7	ថ្លៃអគ្គីសនី	ខែ	12	20,000	240,000
8	ថ្លៃប្រេងឥន្ធុ៖	ខែ	12	40,000	480,000
ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ					5,890,000
1	ស្រះចិញ្ចឹម (២៥ម៉ែ x ១៥ម៉ែ x ២ម៉ែ)	ម៉ែ ^៣	750	5,000	3,750,000
2	របងប្តូរហ៊ុនជុំវិញស្រះ	ស្រះ	1	400,000	400,000
3	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (សំង)	គ្រឿង	1	480,000	480,000
4	ម៉ាស៊ីនកិនចំណី	គ្រឿង	1	600,000	600,000
5	ទុយោបូមទឹកទន់	ម៉ែត្រ	50	4,000	200,000
6	រៀបចំបន្ទះក្តារដាក់ចំណី	ស្រះ	1	60,000	60,000
7	សម្ភារៈជំនួយផ្សេងៗ	ឈុត	1	400,000	400,000

៤-៣- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹម១វគ្គ៖

- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកន្ទាយនៅក្នុងស្រះមានទំហំ ៣៧៥ម៉ែ^២ (២៥ម៉ែ x ១៥ម៉ែ) ដោយបានដាក់កូនកន្ទាយពូជសរុបចំនួន ៣,០០០ក្បាល ចិញ្ចឹមរយៈពេល ១២ខែ (ក្នុង១វគ្គ) ក្រោយកាត់រំលស់លើការចំណាយថេរ និងការចំណាយលើការផលិត៖

ចំណាយសរុប (រៀល)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណេញសរុប (រៀល)
១៩,២១៣,៤៥២	៤០,៨០០,០០០	២១,៥៨៦,៥៤៨

- តារាងចំណូល-ចំណាយលម្អិត៖

លរ	មុខចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃរាយ (រៀល)	ចំនួនវដ្ត រំលស់	តម្លៃសរុប (រៀល)
ចំណូលពីការលក់						
1	ចំណូលពីការលក់	គ. ក	1,275	32,000		40,800,000
ចំណាយសរុប ក+ខ						19,213,452
ក-ការចំណាយប្រែប្រួល						18,475,000
1	កូនកន្ទាយពូជ	ក្បាល	3,000	4,000		12,000,000
2	ចំណីសម្រេច(ប្រូតេអ៊ីន ៣០-៤០%)	គ. ក	500	4,800		2,400,000
3	ចំណីផ្សំ និងស្រស់(២ដង/សប្តាហ៍)	គ. ក	720	2,000		1,440,000
4	កំបោរស	គ. ក	40	2,000		80,000
5	កម្លាំងពលកម្ម (៤៥ថ្ងៃ/វគ្គ)	ថ្ងៃ	45	35,000		1,575,000
6	ថ្នាំកែទឹក/វគ្គចិញ្ចឹម	វគ្គ	1	260,000		260,000
7	ថ្លៃអគ្គីសនី	ខែ	12	20,000		240,000
8	ថ្លៃប្រេងឥន្ធុ៖	ខែ	12	40,000		480,000
ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ						738,452
1	ស្រះចិញ្ចឹម (២៥ម៉ែ x ១៥ម៉ែ x ២ម៉ែ)	ម៉ែត្រគីប	750	5,000	20	187,500
2	របងឬរបាំងជុំវិញស្រះ	ស្រះ	1	400,000	4	100,000
3	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (សំង)	គ្រឿង	1	480,000	7	68,571
4	ម៉ាស៊ីនកិនចំណី	គ្រឿង	1	600,000	7	85,714
5	ទុយោបូមទឹកទន់	ម៉ែត្រ	50	4,000	3	66,667
6	រៀបចំបន្ទះក្តាដាក់ចំណី	ស្រះ	1	60,000	2	30,000
7	សម្ភារៈជំនួយផ្សេងៗ	ឈុត	1	400,000	2	200,000
ចំណេញសរុបក្រោយពីកាត់ចំណាយ						21,586,548
ចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការចិញ្ចឹមកន្ទាយក្នុង១ គ. ក						15,069
ចំណេញពីការផលិតកន្ទាយសាច់ ១ គ. ក						16,931

៤-៤-ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់៖

តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កសិករដែលក្រុមការងារបានសិក្សាផ្ទាល់ ការចិញ្ចឹមកន្ទាយមានអត្រាបាត់បង់តិច (ចន្លោះពី១០-១៥%) ក្នុងលក្ខខណ្ឌកសិករមានការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកបានល្អ ការការពារថែទាំបានល្អ និងការផ្តល់ចំណីគ្រប់គ្រាន់។ ចំណុចសំខាន់គឺទំហំកូនកន្ទាយមិនស្មើគ្នា នាំឱ្យទិន្នផលសរុបមានការប្រែប្រួល។ លទ្ធផលវិភាគរួមមានដូចខាងក្រោម៖

ទិន្នផលទទួលបាន (គ.ក)	តម្លៃលក់ចេញ (រៀល)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណាយសរុប (រៀល)	ចំណេញ (រៀល)	កំណត់សម្គាល់អំពីទិន្នផល
1,275	32,000	40,800,000	19,213,452	21,586,548	ករណីមានអត្រាបាត់បង់ ១៥% និងមានទម្ងន់មធ្យម ០.៦គ.ក/ក្បាល
	40,000	51,000,000	19,213,452	31,786,548	
	48,000	61,200,000	19,213,452	41,986,548	
1,530	32,000	48,960,000	19,213,452	29,746,548	ករណីមានអត្រាបាត់បង់ ១៥% និងមានទម្ងន់មធ្យម ០.៧គ.ក/ក្បាល
	40,000	61,200,000	19,213,452	41,986,548	
	48,000	73,440,000	19,213,452	54,226,548	
1,785	32,000	57,120,000	19,213,452	37,906,548	ករណីមានអត្រាបាត់បង់ ១៥% និងមានទម្ងន់មធ្យម ០.៨គ.ក/ក្បាល
	40,000	71,400,000	19,213,452	52,186,548	
	48,000	85,680,000	19,213,452	66,466,548	
2,040	32,000	65,280,000	19,213,452	46,066,548	ករណីមានអត្រាបាត់បង់ ១៥% និងមានទម្ងន់មធ្យម ០.៩គ.ក/ក្បាល
	40,000	81,600,000	19,213,452	62,386,548	
	48,000	97,920,000	19,213,452	78,706,548	

៥-ហានិភ័យ-បញ្ហាប្រឈម

តាមការសិក្សាផ្ទាល់នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកន្ទុយ នៅស្រុកព្រួញ ខេត្តសៀមរាប កសិករចិញ្ចឹមតែងជួបនូវហានិភ័យមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

ក. ហានិភ័យផលិតកម្ម៖

-ប្រភពទឹកស្អាតមិនគ្រប់គ្រាន់៖ ទោះបីជាកន្ទុយអាចរស់នៅលើគោកបានដោយ ប៉ុន្តែកសិករត្រូវមានផែនការពិនិត្យគុណភាពទឹកទៀងទាត់ និងមានប្រភពទឹកស្អាត សម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពី ២០-៥០% ក្នុងរយៈពេលពី ១-២ខែម្តង ដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីខូចគុណភាពទឹក ដូចនេះ ត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងដែលមានប្រភពទឹកពេញ១ឆ្នាំ។

-គុណភាពកូនពូជមិនល្អ៖ សុខភាពខ្សោយ ទំហំកូនមិនស្មើគ្នា បណ្តាលឱ្យការលូតលាស់មិនស្មើគ្នា និងមានអត្រាបាត់បង់ខ្ពស់។ កសិករត្រូវស្គាល់ប្រភព និងពិនិត្យកូនកន្ទុយពូជឱ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលទិញមកចិញ្ចឹម។

-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមិនច្បាស់លាស់៖ កសិករត្រូវចិញ្ចឹមកន្ទុយតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវទើបទទួលបានជោគជ័យ។ ក្នុងដំណើរការចិញ្ចឹមកន្ទុយ បញ្ហាអាចកើតឡើងដោយមិននឹកស្មានដល់ដែលអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងរួមមាន ៖ ការរៀបចំស្រះការពារពីសត្វចង្រៃ ការជ្រើសរើសពូជ ដងស៊ីតេដាក់ចិញ្ចឹម ការផ្តល់ចំណី ការការពារ និងការបង្ការជំងឺផ្សេងៗ។

ខ. ហានិភ័យបរិស្ថាន/ធម្មជាតិ៖

ពេលមានភ្លៀងខ្លាំងឬច្រើនថ្ងៃ ធ្វើឱ្យទឹកក្នុងស្រះមានកម្រិតអាស៊ីតខ្ពស់ នាំឱ្យកូនកន្ទុយអន់ស៊ីចំណី និងអាចបង្កជាជំងឺរលាក និងពពួកផ្សិត។ អ្នកចិញ្ចឹមត្រូវពិនិត្យ និងតាមដានជាប្រចាំ នូវកម្រិត pH និងសីតុណ្ហភាពទឹក ដើម្បីអាចដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលា។

៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

តាមការចុះសិក្សាផ្ទាល់ជាមួយកសិករចិញ្ចឹមកន្ទាយនៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ឃើញថាការចិញ្ចឹមកន្ទាយនៅក្នុងស្រះមានដំណើរការល្អ។ តម្លៃថ្លៃដើមផលិតប្រមាណ ១៥,០០០រៀល/គ.ក ចំណែកតម្លៃកន្ទាយសាច់នៅលើទីផ្សារលក់ដុំ ៣២,០០០រៀល/គ.ក និងតម្លៃលក់រាយ ៤៨,០០០រៀល/គ.ក ដែលកសិករអាចទទួលបានផលចំណេញពី ១៧,០០០-៣៣,០០០រៀល/គ.ក។

ដោយឡែក ការអនុវត្តបច្ចេកទេសរបស់កសិករនៅមានចំណុចខ្វះខាតតិចតួចដែលត្រូវការកែលម្អដូចជា ការរៀបចំស្រះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីការពារពីពពួកសត្វចង្រៃ។ កូនកន្ទាយពូជត្រូវមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងការពិនិត្យគុណភាពទឹកត្រូវធ្វើឱ្យបានទៀងទាត់ ដោយផ្ដោតលើកម្រិត pH កម្រិតអ័រម៉ូញាក់ និងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទឹកបើចាំបាច់។ ការផ្តល់ចំណីត្រូវមានការគណនាត្រឹមត្រូវនិងតាមដានការលូតលាស់ ដើម្បីវាយតម្លៃលើគុណភាពចំណីដែលបានប្រើប្រាស់។



ប្រភពឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

- ១- កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកន្ទាយ នៅស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប
- ២- ឯកសារបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកន្ទាយនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- ៣- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកន្ទាយនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook និង Telegram មួយចំនួនរួមមាន៖
 - Telegram: ក្រុមអ្នកជួបបញ្ជាក់ការចិញ្ចឹមកន្ទាយ <https://t.me/kuntheay>
 - បណ្ណាល័យកសិកម្ម ÷ <https://elibrary.maff.gov.kh/>
 - <https://www.thuysanvietnam.com.vn/ky-thuat-nuoi-baba-theo-tieu-chuan-vietgap>
 - <https://www.nuoi-baba.com/tinh-toan-hieu-qua-nuoi-baba-phuong-phap-hach-toan/>
 - <https://tincay.com/hieu-trinh-xu-ly-nuoc-ao-baba-dau-mua-mua/>
 - FAO: [http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Trionyx sinensis/en](http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Trionyx_sinensis/en)
 - [https://vi.m.wikipedia.org>Ho Ba ba-Wikipedia tieng viet](https://vi.m.wikipedia.org>Ho_Ba_ba-Wikipedia_tiang_viet)
 - www.rasmeinews.com (កន្ទាយក្បាលកង្កែបនៅកម្ពុជា ប្រភពក្រសួងបរិស្ថាន Jul 31, 2017)
 - <https://khomay3a.com>