



ធនាគារកសិកម្មជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK
ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ដំណាំឪឡឹកសាច់លឿង WATER MELON CULTIVATION



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ធនាគារកសិកម្មជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.ប៊ី)

ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣



023 220 811
023 220 810
012 881 995

#9-13, Street 7, Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh | info@ardb.com.kh | www.ardb.com.kh

មាតិកា

១- សេចក្តីផ្តើម.....	១
២- ការអនុវត្តការដាំដុះ.....	១
ក- ការរៀបចំដី.....	១
ខ- ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក.....	១
គ- ការជ្រើសរើសពូជ.....	១
ឃ- រដូវកាលដាំដុះ.....	២
ង- វិធីដាំដុះ.....	២
ច- ការថែទាំ.....	២
ឆ- ការដាក់ជី.....	២
ជ- កត្តាចង្រៃ.....	២
ឈ- អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល.....	២
ញ- និន្នាកាតតម្លៃ.....	៣
៣- តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំ “ឪឡឹកសាច់លឿង” សម្រាប់ផ្ទៃដីទំហំ ១ ហិកតា.....	៣
៤- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំឪឡឹកសាច់លឿងលើផ្ទៃដីទំហំ១ហិកតា ដាំពាវដុះក្នុងមួយឆ្នាំ.....	៣
៥- លទ្ធភាពចំណេញផ្នែកលើនិន្នាកាតតម្លៃ លើផ្ទៃដីទំហំ ១ ហិកតា.....	៤
៦- ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ.....	៥
៧- ហានិភ័យ.....	៥
៨- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	៦

ដំណាំឪឡឹកសាច់លឿង

១-សេចក្តីផ្តើម


ឪឡឹកសាច់លឿងជាប្រភេទបន្លែយកផ្លែ ដែលអាចបរិភោគផ្លែនៅខ្លីធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ស្ល និងផ្លែទុំ ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកបរិភោគ។ ដំណាំឪឡឹកសាច់លឿងដែលកសិករ កម្ពុជានិយមដាំគឺប្រើគ្រាប់ពូជនាំចូលពីក្រៅប្រទេស។ បច្ចុប្បន្នឪឡឹកត្រូវបានបង្កាត់ចេញជាពូជច្រើន ប្រភេទដូចជា ផ្លែឪឡឹកសម្បកពណ៌បៃតងចាស់សាច់ក្រហម ឪឡឹកសម្បកពណ៌បៃតងចាស់សាច់លឿង និងផ្លែឪឡឹកសំបកពណ៌លឿងសាច់ក្រហម។ បច្ចុប្បន្នឪឡឹកសាច់លឿងទទួលបានការគាំទ្រ និងមាន តម្លៃល្អជាងឪឡឹកសាច់ក្រហម។

២-ការអនុវត្តការដាំដុះ


ក. ការរៀបចំដី៖ ភ្នំរដ៏ឱ្យម៉ដ្ឋល្អពី២ ទៅ៣សារ រួចហាលដីទុករយៈពេលពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ។ គួត ជាងដែលមានទទឹងរងពី ១ម៉ែត្រ ប្រើប្រាស់ដីធម្មជាតិទ្រាប់បាតក្នុងបរិមាណ៤តោន/ហិកតា តាមរង ដំណាំ ដោយទុកចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយប្រវែង៣ម៉ែត្រ។ នៅរដូវប្រាំងគួរប្រើប្រាស់គម្របសរីរាង្គលើ រងដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើម និងកម្ដៅ ឯរដូវវស្សាគួរប្រើសរីរាង្គស្លឹកដើម្បីកាត់បន្ថយ ស្មៅចង្រៃ ការជំងឺក និងរក្សាសំណើម។

ខ. ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក ៖ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹកទ្រីប គឺសមស្របសម្រាប់ដំណាំឪឡឹក។

គ. ការជ្រើសរើសពូជ៖ ពូជមួយចំនួនដែលកសិករជ្រើសរើសសម្រាប់ការដាំដុះ



ពូជ Watermelon WAT-2710



ពូជ Watermelon WAT-2789



ពូជ 169

- ពូជ Watermelon WAT-2710 និងពូជ Watermelon WAT-2789 នាំចូលពីចិនតៃវ៉ាន់ ផលិត ដោយក្រុមហ៊ុន KNOWN-YOU

- ពូជ169 នាំចូលពីប្រទេសថៃ ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Advance

ឃ.រដូវកាលដាំដុះ៖ ដំណាំឪឡឹកសាច់លឿងអាចដាំបានគ្រប់រដូវ ប៉ុន្តែដោយសារកសិករភាគច្រើនដាំនៅលើទីវាលគួរដាំដុះចាប់ពីខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ខែឧសភា។ ការដាំឪឡឹកលឿងដែលអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ គួរដាំចន្លោះពីខែមករា រហូតដល់ខែឧសភា ដោយសារខែនេះមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់ ដែលធ្វើឱ្យដំណាំឪឡឹកមិនសូវមានជំងឺ និងរលួយផ្ទៃ។

ង.វិធីដាំដុះ៖ ត្រូវយកកូនឪឡឹកដែលមានអាយុពី៧-១០ថ្ងៃ ក្នុងថាសបណ្តុះមកដាំលើរងដែលបានលើករួចរាល់ ដោយដាំក្នុងចន្លោះគុម្ព ៥០ស.ម ចំណែកចន្លោះរងគឺទុកសម្រាប់ឱ្យដើមឪឡឹកលូតលាស់។

ច.ការថែទាំ៖ ត្រូវស្រោចទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ២ដង គឺនៅពេលព្រឹកម្តង និងពេលរសៀលម្តង ផ្អែកលើសំណើមដីដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក។ បន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេល៣ថ្ងៃឡើងទៅត្រូវមានកាលវិភាគប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវសាស្ត្រ និងថ្នាំពុលកសិកម្ម បង្ការជំងឺ និងសត្វល្អិត សម្រាប់ការពារករណីដែលអាចកើតមានកត្តាចង្រៃបំផ្លាញដំណាំ ។

ឆ.ការដាក់ជី៖ ក្រោយការដាំដុះរួចរាល់ត្រូវមានកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជីសម្រាប់ឪឡឹកសាច់លឿង។ កសិករអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទជីទឹក នៅដំណាក់កាលលូតលាស់ ដោយបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក និងការបាញ់បន្ថែមទៅលើស្លឹក។

ជ.កត្តាចង្រៃ៖ ជាទូទៅកសិករតែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់នូវកត្តាចង្រៃដែលបំផ្លាញដំណាំឪឡឹកមានដូចជា ៖ អណ្តើកមាស រុយស ពឹងពាងក្រហម ដង្កូវស៊ីញ៉េ ទ្រីព និងជំងឺផ្សិតជាដើម។



ឈ.អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល៖ អាយុកាលបណ្តុះកូន ប្រើប្រាស់ពេលពី៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ ចាប់ពីពេលដាក់ដាំកូនរហូតដល់ចេញផ្កាមានរយៈពេល២៥-៣០ថ្ងៃ។ កសិករអាចប្រមូលផលផ្លែឪឡឹកសាច់លឿងបានបន្ទាប់ពីដាំបានអាយុពី៥៥-៦០ថ្ងៃ (ចាប់ពីដាក់គ្រាប់រហូតបានប្រមូលផល រយៈពេលពី

៦០-៧០ថ្ងៃ)។ រសជាតិផ្ទៃមរបស់ឌីឡីកសាច់លឿង នឹងប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ ក្រោយពេលទុំ ដូច្នេះត្រូវតែប្រាកដថាការប្រមូលផលត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាជាក់លាក់។ ត្រូវមានឧបករណ៍រក្សាទុក ឌីឡីកទុំពេលដឹកជញ្ជូនដើម្បីការពារឌីឡីកពីការជាំ ឬបែក។

៣. និន្នាកាតម្តង៖ ឌីឡីកគ្រប់ប្រភេទគឺងាយស្រួលដាំដុះចាប់ពីរដូវវស្សា ក្នុងខែវិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា។ ឌីឡីកទទួលបានតម្លៃសមរម្យនៅរដូវវស្សាដោយសារពិបាកក្នុងការដាំដុះ។

៣-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះឌីឡីកសាច់លឿង (លើផ្ទៃដីទំហំ ១ហិកតា)

បរិយាយ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)
ចំណាយលើការដាំដុះ	17,880,000
ចំណាយលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព	29,800,000
សរុប	47,680,000

៤-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំឌីឡីកសាច់លឿង (លើផ្ទៃដីទំហំ ១ហិកតា)

រយៈពេលដាំដុះ ៦០-៧០ថ្ងៃ / រដូវ (ការដាំដុះនៅស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	ទឹកប្រាក់ (រៀល)	ចំនួន សារ រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប (រៀល)
១-ចំណូលពីការលក់	គ.ក	25,000	2,000	50,000,000		50,000,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល						21,466,667
២.ក-ចំណាយប្រែប្រួលសរុប						17,880,000
ភ្នំដី	សារ	3	300,000	900,000		900,000
ពូជ	កញ្ចប់	20	80,000	1,600,000		1,600,000
ពលកម្ម	នាក់/ ដង	32	30,000	960,000		960,000
ជីធម្មជាតិសញ្ញាផែនដី	បារ	80	110,000	8,800,000		8,800,000
ជីទឹក បំប៉ន	រដ្ឋ	1	500,000	500,000		500,000
ជី កាល់ប្រូរ	កញ្ចប់	10	35,000	350,000		350,000
ថ្នាំសត្វល្អិត និងជំងឺ	រដ្ឋ	1	2,000,000	2,000,000		2,000,000

ឈ្នួលបាញ់ថ្នាំ	ថ្លៃ/ ដង	20	50,000	1,000,000		1,000,000
ដីបណ្តុះ(៤០គ.ក)	កាប់	3	240,000	720,000		720,000
អន្ទាក់ស្អិត	សន្លឹក	400	2,000	800,000		800,000
ថាសបណ្តុះ	កេះ	1	250,000	250,000		250,000
២.១-ចំណាយមិនប្រែប្រួលសរុប						3,586,667
សូឡាបូមទឹក(៥ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	20,000,000	20,000,000	15	1,333,333
ទុយោមេ (៥ឆ្នាំ)	ម៉ែត្រ	100	24,000	2,400,000	15	160,000
ទុយោចែកចាយ (៥ឆ្នាំ)	ម៉ែត្រ	100	14,000	1,400,000	15	93,333
ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក(១ឆ្នាំ)	ឈុត	1	6,000,000	6,000,000	3	2,000,000
៣-ចំណេញសរុប						28,533,333
ថ្លៃដើម/ គ.ក						858.67
ចំណេញ/ គ.ក						1,141.33

៥-លទ្ធភាពចំណេញផ្អែកលើនិស្សាភារកម្ម លើផ្ទៃដីទំហំ ១ហិកតា៖

- តម្លៃទាបបំផុត ១, ៨០០\$ / គ.ក និងតម្លៃខ្ពស់បំផុត ២, ៥០០\$ / គ.ក

ទិន្នផល គ.ក	តម្លៃ រៀល/ គ.ក	ចំណូល រៀល	ចំណាយ រៀល	ចំណេញ- ខាត	
				រៀល	%
25,000	1,800	45,000,000	21,466,667	23,533,333	110%
25,000	1,900	47,500,000	21,466,667	26,033,333	121%
25,000	2,000	50,000,000	21,466,667	28,533,333	133%
25,000	2,100	52,500,000	21,466,667	31,033,333	145%
25,000	2,200	55,000,000	21,466,667	33,533,333	156%
25,000	2,300	57,500,000	21,466,667	36,033,333	168%
25,000	2,400	60,000,000	21,466,667	38,533,333	179%
25,000	2,500	62,500,000	21,466,667	41,033,333	191%

៦-ខ្សែប្រចារកំប៉ង្កៈ

កសិករ ÷ លក់២,០០០\$/គ.ក - ថ្លៃដើម៨៥៨\$ /គ.ក = ចំណេញ ១,១៤២\$ /គ.ក

ឈ្មួញកណ្តាល ÷ បោះដុំ ៣,០០០\$ /គ.ក(ថ្លៃដឹកជញ្ជូន ៥០០\$ /គ.ក) ចំណេញ ៥០០\$ /គ.ក

អ្នកលក់រាយ ÷ លក់៤,០០០\$ /គ.ក(ជួលតូប និងខូចខាត៥០០\$ /គ.ក) ចំណេញ ៥០០\$ /គ.ក

៧-ហានិភ័យ ÷

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាផ្ទាល់ពីកសិករដាំឱឡិតសាច់លឿងនៅស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានហានិភ័យមួយចំនួនអាចកើតឡើងដោយហេតុលើដំណើរការដាំដុះ ដូចជា÷

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការ
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	ទិន្នផលធ្លាក់ចុះ បណ្តាលមកពីកត្តា - សត្វល្អិត និងជំងឺផ្សិត - ការប្រមូលផលមិនទាន់ពេល - ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន	- គួរប្រើប្រាស់វិធានការការពារដំណាំ និងមានកាលវិភាគប្រើប្រាស់ថ្នាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់សត្វល្អិត និងជំងឺ - ត្រួតពិនិត្យឱឡិតជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រមូលផល ព្រោះអាចបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាព និងរស់ជាតិ។ - រដូវវស្សាគួរដាំដុះនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឱ្យមានដំណើរលំអង តាមរយៈការបេះផ្កាឈ្មោលទៅប៉ះផ្កាញី ឬប្រើប្រាស់កង្ហារ
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ ឧសភា មានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃ ដោយសារអាកាសធាតុអំណោយផល	- ពង្រីកបណ្តាញទីផ្សារឱ្យបានច្រើន ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារតែក្នុងតំបន់ - ចងក្រងក្រុមផលិត ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យា ទិញ-លក់ និងធ្វើផែនការផលិតតាមកិច្ចសន្យា - ផលិតឱ្យបានទាំងបរិមាណ និងគុណភាព - ធ្វើការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទីផ្សារជាប្រចាំ

៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ឪឡឹកសាច់លឿងគឺជាដំណាំងាយស្រួលថែទាំ មានអាយុកាលខ្លី មិនសូវខ្វះទីផ្សារនោះទេ ព្រោះ មានឈ្មួញមកទទួលទិញដល់ចម្ការ ដើម្បីលក់ចែកចាយទៅទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនៅផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ ដោយលក់ក្នុងតម្លៃបោះដុំ១,៨០០-២,០០០\$ /គ.ក ជាតម្លៃដែលកសិករមានលទ្ធភាពចំណេញ ហើយម្យ៉ាងទៀតតម្លៃឪឡឹកសាច់លឿងមិនសូវប្រែប្រួលខ្លាំងដូចដំណាំបន្លែផ្សេងៗទៀតទេ ហើយថែម ទាំងមានការពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកបរិភោគទៀតផង។



ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

- កសិករដាំដុះឪឡឹកសាច់លឿងស្ថិតនៅឃុំភ្នំតូច នៅស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
- ឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ