



**ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម**  
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK  
ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

# **គម្រោងអាជីវកម្មដំណាំត្រសក់ផ្លែប** **ក្នុងផ្ទះសំណាញ់** **MUSK MELON CULTIVATION** **IN NET HOUSE**



រៀបចំដោយ

**គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ**  
**ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.បី)**

ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣



023 220 811  
023 220 810  
012 629 995

#9-13, Street 7, Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh | [info@ardb.com.kh](mailto:info@ardb.com.kh) | [www.ardb.com.kh](http://www.ardb.com.kh)

## មាតិកា

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ១- សេចក្តីផ្តើម.....                                                                    | ១  |
| ២- ការអនុវត្តការដាំដុះ.....                                                             | ១  |
| ២.១ ការជ្រើសរើសពូជ.....                                                                 | ១  |
| ២.២ រដូវកាលដាំដុះ.....                                                                  | ១  |
| ២.៣ ការរៀបចំដី.....                                                                     | ១  |
| ២.៤ ការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក និងការគ្របរង.....                                | ២  |
| ២.៥ ការដាំកូន.....                                                                      | ២  |
| ២.៦ ការរៀបចំចំណារ និងទ្រើង.....                                                         | ៣  |
| ២.៧ ការថែទាំ.....                                                                       | ៣  |
| ក. ការតាក់តែងមែក.....                                                                   | ៣  |
| ខ. ការជ្រើសរើសផ្លែ.....                                                                 | ៣  |
| គ. ការចងផ្លែ.....                                                                       | ៤  |
| ឃ. ការដាក់ជី.....                                                                       | ៤  |
| ២.៨ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺ.....                                                  | ៤  |
| ក. សត្វល្អិត វិធានការការពារ កម្ចាត់.....                                                | ៤  |
| ខ. ជំងឺ និងវិធានការការពារ ព្យាបាល.....                                                  | ៥  |
| ២.៩. អាយុកាលដាំដុះ និងការប្រមូលផល.....                                                  | ៨  |
| ៣- តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំត្រសក់ផ្អែម ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ..... | ៨  |
| ៤- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះដំណាំត្រសក់ផ្អែម ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ.....   | ៩  |
| ៥- លទ្ធភាពចំណេញផ្អែកលើបម្រែបម្រួលទិន្នផល.....                                           | ១០ |
| ៦- ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ.....                                                                | ១០ |
| ៧- ហានិភ័យ.....                                                                         | ១១ |
| ៨- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....                                                               | ១១ |

## ១-សេចក្តីផ្តើម

ត្រសក់ផ្អែមជាដំណាំថ្មីមួយប្រភេទដែលទើបនាំចូលគ្រាប់ពូជមកដាំដុះនៅកម្ពុជា។ បច្ចេកទេសដាំដុះ ថែទាំប្រភេទដំណាំមួយនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ កសិករនៅតំបន់មួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមដាំដុះត្រសក់ផ្អែម ពីព្រោះមានតម្រូវការទីផ្សារ និងមានតម្លៃថ្លៃសមរម្យ។ ការពិពណ៌នាជាច្រើនបានបង្ហាញថា ផ្លែត្រសក់ផ្អែមមានរសជាតិឆ្ងាញ់ (ត្រសក់ទុំ) មានអាហារូបត្ថម្ភសម្បូរបែប ថែមទាំងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពដល់អ្នកបរិភោគទៀតផង។

## ២-ការអនុវត្តការដាំដុះ

**២.១. ការជ្រើសរើសពូជ៖** ត្រសក់ផ្អែម មានពូជច្រើនប្រភេទដែលនាំចូល ហើយពុំអាចទុកពូជបន្តបានទេ (ពូជកូនកាត់/Hybrid-F1) ។ ពូជដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺពូជត្រសក់ផ្អែមសំណាញ់ខៀវ (Green net melon) ។



**២.២. រដូវកាលដាំដុះ៖** ត្រសក់ផ្អែមអាចដាំបានគ្រប់រដូវកាលដោយដាំដុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់។ រីឯនៅលើទីវាលកសិករអាចដាំដុះបានចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែកុម្ភៈ ដោយរំពឹងការប្រមូលផលនៅអំឡុងខែមករា ដល់ខែមេសា។ ត្រសក់ផ្អែម ជាដំណាំដែលត្រូវការពន្លឺថ្ងៃ ហើយងាយរងការបំផ្លាញពីជំងឺ សត្វល្អិត និងដីជាំទឹក។

**២.៣. ការរៀបចំដី៖** គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់សម្រាប់ដំណាំត្រសក់ផ្អែម។ ការរៀបចំដីបានល្អ ធ្វើឱ្យកូនត្រសក់មានសុខភាពល្អ មិនងាយរងនូវជំងឺនានា ជាពិសេសជំងឺលើឫសដំណាំ។ កសិករត្រូវភ្ជួរដីឱ្យម៉ដ្ឋល្អពី ២-៣សារ និងហាលដីរយៈពេលពី ១០-១៥ថ្ងៃ។ ក្រោយពីហាលដីរួចត្រូវយកជីកំប៉ុស្តិ៍គោកចំនួន ០.៥គ.ក/ម<sup>២</sup> ប្រើដីទ្រាប់បាត ២០-២០-១៥+TE ចំនួន ១៦ក្រាម/ម<sup>២</sup> ទៅបាចហើយរាស់លុប ទើប



លើកជារងដោយប្រើគម្លាតពីពាក់កណ្តាលរងមួយទៅពាក់កណ្តាលរងមួយ ១.៣-១.៥ម៉ែត្រ ទទឹងរង ០.៨ ម៉ែត្រ និងកម្ពស់រងពី ០.២០ - ០.៣០ម៉ែត្រ។

**២.៤. ការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក និងការគ្របរង៖** ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្ម និងគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អតាមតម្រូវការលូតលាស់របស់ដំណាំត្រសក់ផ្អែម។ កសិករត្រូវដាក់ទុយោដំណាក់ទឹកលើរង ដោយដាក់ផ្នែកដែលមានរន្ធមកខាងលើ។ បន្ទាប់មកកសិករអាច គ្របរងដោយចំបើង ឬស្លឹករុក្ខជាតិស្ងួត ឬកៅស៊ូគ្របរង ដើម្បីជួយរក្សាសំណើមដី ការហូរច្រោះរង និង ការពារស្មៅដុះ។ កសិករត្រូវប្រើកៅស៊ូគ្របរងដោយយកផ្នែកខ្មៅផ្តាច់ចុះក្រោម និងយកបន្ទះឬស៊ីរ៉ូចៗ ដោតភ្ជាប់នឹងដីឬកាយដឹកបំប្លែងជើងថង់ប្លាស្ទិកគ្របរង។ កសិករត្រូវគ្របរងយ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃមុនដាំកូន ដំណាំ ដើម្បីឱ្យងាប់ស្មៅ និងកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលមាននៅក្នុងដីនៃរងដំណាំ។




**២.៥. ការដាំកូន៖** ដំបូងត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកបណ្តុះក្នុងថាសបណ្តុះរយៈពេល ៩-១២ ថ្ងៃ ទើប ដកមកដាំក្នុងរងដំណាំដែលបានរៀបចំរួចរាល់។ បីថ្ងៃមុនដាំដុះត្រូវស្រោចស្រពលើរងឱ្យជោកឆ្អែតទឹក ដោយលាយជាមួយថ្នាំកម្ចាត់ជំងឺផ្សិត មេតាឡាក់ស៊ីល (Metalaxyl) ដើម្បីការពារជំងឺផ្សិត។

ពេលវេលាដាំកូនដំណាំដែលល្អបំផុត គឺនៅពេលរសៀល (ចាប់ពីម៉ោង ៣ល្ងាចទៅ) ដោយមាន ចន្លោះគុម្ពពី ៦០-៧០ស.ម ពីរជួរក្នុងមួយរង (ដាំមុចគ្រាន់) ដើម្បីឱ្យត្រសក់ផ្អែមអាចស្រូបជីជាតិ និងលូត លាស់បានល្អ។ ទំហំដី ២៥០ម<sup>២</sup> ត្រូវដាំកូនដំណាំត្រសក់ផ្អែមចំនួន៥០០ដើម ដោយបូកបន្ថែមការ បាត់បង់ ១០% ដូច្នេះកសិករត្រូវការកូនដំណាំសរុបចំនួន ៥៥០ដើម។



**២.៦. ការរៀបចំចំណារ និងទ្រើង៖** គួរធ្វើឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីដាំកូនដំណាំរួច ដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនត្រសក់។ ចំណារទ្រើងធ្វើពីបង្គោលឈើ ឬឫស្សីដោយដោតជាជួរ និងប្រើខ្សែនីឡុងចងជាទ្រើង សម្រាប់ដើមត្រសក់ផ្ដើមពោងរុំឡើង។



**២.៧. ការថែទាំ៖** ត្រូវស្រោចទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ២ដង គឺនៅពេលព្រឹក និងពេលរសៀលផ្នែកលើសំណើមដីដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក(មិនត្រូវការទឹកជោគជាំនោះទេ)។ ដំណាំត្រសក់ផ្ដើមជាដំណាំងាយជួបបញ្ហាជំងឺ និងសត្វល្អិត ដែលត្រូវការការថែទាំច្រើន។

**ក. ការកាត់តែងមែក៖** ត្រសក់ផ្ដើមក្នុងមួយដើមតម្រូវទុកតែមួយផ្លែ ដូចនេះការកាត់តែងមែក និងធ្វើខ្លែងជាការងារសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យក្នុងផលិតកម្មផងដែរ។ ក្រោយដាំបាន១២ថ្ងៃ កសិករចាប់ផ្ដើមកាត់ពីខ្លែងទី១ ដល់ខ្លែងទី៨ ត្រូវរក្សាខ្លែងទី ៩ដល់ទី១២ សម្រាប់ជ្រើសរើសផ្លែ ហើយខ្លែងបន្ទាប់ត្រូវកាត់ចេញរហូតដល់ខ្លែងចុងក្រោយ។ បន្ទាប់មកត្រូវកាត់ត្រួយនៅពេលមានស្លឹកចាប់ពីទី២១-២៥ អាស្រ័យលើសុខភាពដំណាំ ដែលអាចមានកម្ពស់ដើមពី ១.៦-១.៨ម៉ែត្រ។

**ខ. ការជ្រើសរើសផ្លែ៖** ធ្វើឡើងពីពេលដំណាំត្រសក់មានអាយុចាប់ពី ៣០-៣៥ថ្ងៃ។ ផ្កាញីដែលចេញនៅខ្លែងទី៩-១២ត្រូវរក្សាទុកឱ្យបង្កកំណើតកាន់ជាភ្លឹប។ ភ្លឹបដែលកាន់មានពណ៌បៃតងស្រស់ ឯផ្កាខាងចុងភ្លឹបប្រែពណ៌ហើយក្រៀម។ ក្នុង១ដើមត្រូវរក្សាទុកភ្លឹបយ៉ាងតិច៣ រហូតដល់ទំហំដែលអាចពិនិត្យឃើញថា ជាភ្លឹបល្អ មានរាងទ្រវែងបន្តិច គ្មានជំងឺ មិនមានស្នាមប្រេះ ឆ្នួត និងសត្វទិចឬបំផ្លាញ។ ក្រោយមកត្រូវរក្សាភ្លឹបតែ១ដែលល្អ ដោយកាត់ភ្លឹបផ្សេងៗនិងខ្លែងលាស់ថ្មីចេញពីដើម ដើម្បីទុកសារធាតុ



ចិញ្ចឹមផ្លែឱ្យលូតលាស់ធំល្អ។ បន្តរំដេត្រសក់ឱ្យត្រូវខ្សែទ្រើង នៅពេលដើមត្រសក់ចេញផុតស្លឹកទី២៣ ឬ២៥ ត្រូវកាត់ចេញ ឬក្រៀវចុងត្រសក់ចោលដើម្បីឱ្យដើមត្រសក់មានធាតុចិញ្ចឹម និងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បំប៉នផ្លែរហូតដល់ទុំ។

**គ.ការចងផ្លែ៖** បន្ទាប់ពីសម្រេចទុកផ្លែចុងក្រោយហើយ ក្តីបដទៃត្រូវកាត់ចេញ។ ចំពោះផ្លែដែល រក្សាទុកត្រូវចងព្យួរបន្ទោងនឹងខ្សែទ្រើងដើម្បីជួយទប់ផ្លែ ការពារផ្លែកុំឱ្យប៉ះកោស្ទ្របរងដែលអាចធ្វើឱ្យ ផ្លែរលួយ មានស្នាម ឬក្រិនផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្លែ។



**ឃ.ការដាក់ជី៖** នៅដំណាក់កាលដំបូងគប្បីប្រើប្រាស់ជីដែលជំរុញដល់ការលូតលាស់ឫស និង ដើម (អាសូត និងផូស្វ័រ)។ នៅពេលដំណាំជិតចេញផ្កាត្រូវបង្កើនជីជំរុញផ្កា ផ្លែ (ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូម) និងជីសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល។



**២.៨.ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺ៖** ជាទូទៅដំណាំត្រសក់ផ្អែមតែងជួបប្រទះជំងឺ និងការ បំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗដែលអាចមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ផ្លែត្រសក់។ ការថែទាំ និងការតាម ដានពិនិត្យមើលដំណាំត្រសក់ផ្អែមជាប្រចាំគឺជាការងារចាំបាច់បំផុត។

**ក.សត្វល្អិត វិធានការការពារ កម្ចាត់៖**

សត្វល្អិតដែលតែងជួបប្រទះលើដំណាំត្រសក់ផ្អែមមានដូចជា៖

- អណ្តើកមាស ពឹងពាងក្រហម រុយស រុយទិចផ្លែ ស្រីង បំផ្លាញពីដំណាក់កាលកូនដំណាំ រហូត ដល់ដំណាក់កាលផ្លែ។

- ដង្កូវស៊ីញ៉េ ដង្កូវស៊ីត្រួយ ដង្កូវមេអំបៅ ដង្កូវមូស្លីក...ជាដើម។ ពួកវាស៊ីបំផ្លាញត្រួយ និងស្លឹកចាប់ពីដំណាក់កាលកូនរហូតដល់ដំណាក់កាលមានផ្លែ ។
- សត្វល្អិត ទ្រីប ចៃ ជញ្ជក់រុក្ខរស ស្លឹកត្រួយខ្ចី ផ្កា ហើយបង្ករោគ និងចម្លងជំងឺវីរុស (ស្លឹករុញ ក្រិន) ធ្វើឱ្យដើម និងស្លឹកត្រសក់ក្រិនរុញក្រញាញ់ ហើយជួនកាលប្រេះក្តិប ឬផ្ទៃខ្ចី។ ចំពោះផ្លែត្រសក់នៅជាប់ដើមដែលមានជំងឺ មើលពីខាងក្រៅមានលក្ខណៈធម្មតា ប៉ុន្តែគុណភាពត្រូវបាត់បង់ (ទំហំន អាយុ រសជាតិសាប ឬមិនសូវផ្អែម សាច់ទន់មិនស្រួយ គ្មានក្រឡាសំណាញ់... )។



- ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបិទ-បើកទ្វារចេញចូល និងជំរះស្មៅនៅជុំវិញផ្ទះសំណាញ់ដែលជាជម្រកសត្វល្អិតចង្រៃ។
- ដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វល្អិត ទ្រីប ដោយប្រើផ្ទាំងក្រដាសអន្ទាក់ស្អិត
- ប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មកម្ចាត់សត្វបំផ្លាញលើដំណាំមានដូចជា៖

- អាបាមិចទីន (Abamectin) កម្ចាត់ពីងពាងក្រហម
- ស្ពីណីតូរ៉ាម ឬកជាមួយ មេថូស៊ីហ្វេនណូសាយ (Spinetoram + Methoxyfenozide) កម្ចាត់ដង្កូវរយ ដង្កូវស៊ីត្រួយ និងដង្កូវស៊ីញ៉េ។
- អ៊ីមីដាក្លូប្រីដ (Imidacloprid) កម្ចាត់ចៃ ទ្រីប រុយស ស្រីង និងដង្កូវស៊ីញ៉េ។
- ភីមេត្រូស៊ីន (Pymetrozine) កម្ចាត់ចៃ
- អេម៉ាមិចទីន ប៊ីនសូអាត (Emamectin Benzoate) កម្ចាត់ទ្រីប ដង្កូវស៊ីត្រួយ និងដង្កូវរយ។
- ក្លរ៉ង់ត្រានីលីប្រូល (Chlorantraniliprole) កម្ចាត់ដង្កូវរយ

**ខ.ជំងឺ និងវិធានការការពារ ព្យាបាល៖** ត្រសក់ផ្អែមតែងជួបប្រទះជំងឺមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

**ជំងឺអង់ត្រាក់ណូស (Anthracnose) ៖** រោគសញ្ញាសំខាន់ៗរបស់វារួមមាន៖ ស្លឹកចាប់ផ្តើមលេចចេញស្នាមអុជមូលៗហើយប្រែជាពណ៌លឿង។ នៅលើផ្លែមានស្នាមអុជមូល ក្រៀមផុតចូលក្នុងសាច់ផ្លែ។ នៅលើដើមមានស្នាមជាំឬដំបៅ ហើយធ្វើឱ្យដើម និងស្លឹកស្រពោន។



**ជំងឺ Downy Mildew និងជំងឺ Powdery Mildew ÷** បង្កឡើងដោយពពួកផ្សិតដែលកសិករច្រើនតែជួបប្រទះនៅដំណាក់កាលផ្លែ។ កើតមាននៅលើស្លឹកត្រសក់ ដែលប្រែពណ៌ពីបៃតងចាស់ទៅលឿងខ្ចី យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹកមានចេញជាម្សៅ។



**ជំងឺរលាកគល់កូនដំណាំ (Damping Off) ÷** កូនដំណាំតូចៗ ដួលទាំងនៅស្រស់ ដោយនៅផ្នែកគល់មានពណ៌ត្នោត ឬខ្មៅហើយរលួយ ដែលងាយឆ្លងពីដើមមួយទៅដើមមួយ។



**ជំងឺរលាកចេញជ័រ (Gummy Stem Blight) ÷**



**ជំងឺហ្វូហ្វារីយ៉ូមស្រពោន (Fusarium Rot, Fusarium Wilt) ÷** គឺជាជំងឺផ្សិតប៉ះពាល់ដល់ជាលិការុក្ខជាតិដែលបណ្តាលឱ្យបូសដំណាំរលួយ មិនលូតលាស់ ស្លឹកនិងផ្លែដំណាំប្រែជាស្រពោន និងងាប់។



**ជំងឺរលាកដើមក្លេរីទីញូមូលស៊ី (Southern Blight/White Mold) ÷**



**ជំងឺបាក់តេរីយ៉ូស៊ីសផ្លែ (Bacterial Fruit Blotch) ÷**



**ជំងឺបាក់តេរីយ៉ូស៊ីស (Angular Leaf Spot) ÷**



**វិធានការការពារ និងព្យាបាល÷**

- លាយល្បាយដីបណ្តុះកូនឱ្យបានល្អ ដោយលីងឬចំហុយដីសម្លាប់មេរោគផ្សិត
- ប្រើប្រាស់ពូជធន់នឹងជំងឺនេះ
- ជ្រើសរើសទីតាំងដែលមានចរន្តខ្យល់បក់ល្អ និងជៀសវាងម្លប់ដើមឈើធំៗ

- ជៀសវាងដាច់ខាតការស្រោចទឹក តាមវិធីបាញ់ពីលើស្លឹក សំណើមច្រើន
- ជៀសវាងការស្រោចទឹកនៅពេលព្រលឹមពេក នៅពេលដែលស្លឹកមានសំណើមដោយទឹកសន្សើម និងនៅពេលល្ងាចពេក នៅពេលដែលស្លឹកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតផ្ទៃរបស់វាមុនពេលមានសំណើម
- រក្សាបរិមាណជីជាតិអាសូតក្នុងកម្រិតសមស្របត្រូវការរបស់ដំណាំ
- ប្រើថ្នាំសកម្មការពារប្រូបាបាល មានដូចជា៖ មេតាឡាក់ស៊ីល (Metalaxyl) ខប់ពើ អ៊ុកស៊ីក្លរីដ (Copper Oxychloride) ខប់ពើ ហ៊ីដ្រូកស៊ីដ (Copper Hydroxide) ឌីហ្វីណូកូណាហ្សូល (Difenoconazole) អាហ្សូស្ត្រូប៊ីន (Azoxystrobin) ថ្យីរ៉ាម (Thiram) ។

**២.៩. អាយុកាលដាំដុះ និងការប្រមូលផល៖**

- អាយុកាលបណ្តុះកូនត្រូវប្រើប្រាស់រយៈពេលពី ៩ ដល់ ១២ថ្ងៃ
- ដាំពី ១-២ជួរក្នុងមួយរងដំណាំ
- ចន្លោះគុម្ព ៦០-៧០ស.ម
- ដាំពាវដ្ឋក្នុងមួយឆ្នាំ
- រយៈពេលដាំដុះ ៦៥-៧៥ថ្ងៃ/វដ្ត

ត្រសក់ផ្អែមជាដំណាំដែលមិនប្រកាន់រដូវដាំដុះ ប៉ុន្តែជាដំណាំមិនត្រូវការទឹកភ្លៀង និងការស្រោចស្រពទឹកជោគជាំនោះទេ។ ជាទូទៅ ដំណាំត្រសក់ផ្អែមអាចប្រមូលផលបាននៅអាយុ ៦៥-៧៥ថ្ងៃក្រោយការដាំ(អាស្រ័យលើពូជ)។ ដើម្បីឱ្យត្រសក់មានរសជាតិផ្អែមល្អ គួរផ្តាច់ទឹក ឬឈប់ស្រោចទឹកមុនពេលប្រមូលផលយ៉ាងតិច៣ថ្ងៃ បើផ្តាច់ទឹកយូរពេកអាចធ្វើឱ្យដើមស្ងួត និងប៉ះពាល់ដល់រសជាតិត្រសក់។ ត្រសក់ផ្អែមអាចរក្សាផ្លែបានពី ៣-៥ថ្ងៃ នៅទីត្រជាក់ ក្នុងកេស ឬទឹកកក ដែលធ្វើឱ្យផ្លែត្រសក់កាន់តែមានរសជាតិផ្អែម និងក្រអូប។

**៣-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំត្រសក់ផ្អែម ក្នុងផ្ទះសំណាក់ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ**

| បរិយាយ                                    | ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) |
|-------------------------------------------|----------------------|
| ចំណាយលើការដាំដុះ- ថែទាំ                   | 1,009,000            |
| ចំណាយលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព និងសម្ភារៈផ្សេងៗ | 12,454,000           |
| <b>សរុប</b>                               | <b>13,463,000</b>    |

**៤-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះដំណាំត្រសក់ផ្លែម ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ**

- បទពិសោធន៍÷ ការដាំដុះរបស់កសិករនៅស្រុករតនៈមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
- ទិន្នផលទទួលបានពី ៦៥%-៨៥% ឬពី ៥៥៣-៧២៣គីឡូក្រាមនៃ៥០០ដើម (ជាមធ្យមមួយ ផ្ទៃមានទម្ងន់ ១.៧ គីឡូក្រាម)
- តម្លៃកំណត់ក្នុងកុងត្រា÷ ៦ ០០០ រៀល/គ.ក

| បរិយាយ                                                  | ឯកតា        | ចំនួន | តម្លៃ/ឯកតា | ទឹកប្រាក់         | ចំនួនសារ | ទឹកប្រាក់សរុប    |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------------|----------|------------------|
| <b>១-ចំណូលពីការលក់</b>                                  | គ.ក         | 638   | 6,000      | 3,828,000         |          | <b>3,828,000</b> |
| <b>២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល</b> |             |       |            |                   |          | <b>1,892,389</b> |
| <b>២.ក-ចំណាយប្រែប្រួលសរុប</b>                           |             |       |            |                   |          | <b>1,009,000</b> |
| ការរៀបចំដី (ភ្នំ និងលើករង)                              | វគ្គ        | 1     | 80,000     | 80,000            |          | 80,000           |
| ពូជ                                                     | កញ្ចប់      | 2     | 16,000     | 32,000            |          | 32,000           |
| ជីកំប៉ុស្តិ៍ កំបោស                                      | វគ្គ        | 1     | 150,000    | 150,000           |          | 150,000          |
| ជីគីមី (N-P-K-Ca-Mg)                                    | គ.ក         | 20    | 4,100      | 82,000            |          | 82,000           |
| ថ្នាំគីមី (សត្វល្អិត ជំងឺ និងជីបប៉ែន)                   | វគ្គ        | 1     | 100,000    | 100,000           |          | 100,000          |
| ប្រេងឥន្ធនៈ(សាំង/ម៉ាស៊ូត)                               | លីត្រ       | 35    | 5,000      | 175,000           |          | 175,000          |
| កម្លាំងពលកម្ម                                           | វគ្គ        | 1     | 270,000    | 270,000           |          | 270,000          |
| ការប្រមូលផល/វេចខ្ចប់                                    | វគ្គ        | 1     | 120,000    | 120,000           |          | 120,000          |
| <b>២.ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួលសរុប</b>                        |             |       |            | <b>12,454,000</b> |          | <b>883,389</b>   |
| ផ្ទះសំណាញ់ (៥ឆ្នាំ)                                     | ម៉ែត្រការ៉េ | 250   | 45,000     | 11,250,000        | 15       | 750,000          |
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (៥ឆ្នាំ)                                  | គ្រឿង       | 1     | 400,000    | 400,000           | 15       | 26,667           |
| ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក (២ឆ្នាំ)                              | ដុំ         | 1     | 80,000     | 80,000            | 6        | 13,333           |
| ទុយោ (៥ឆ្នាំ)                                           | ដើម         | 10    | 7,000      | 70,000            | 15       | 4,667            |
| កៅស៊ូគ្របរង (១ឆ្នាំ)                                    | ដុំ         | 1     | 80,000     | 80,000            | 3        | 26,667           |
| សំណាញ់ទ្រើង (៣ឆ្នាំ)                                    | ដុំ         | 7     | 10,000     | 70,000            | 9        | 7,778            |
| បង្គោលឈើ (២ឆ្នាំ)                                       | ដើម         | 170   | 500        | 85,000            | 6        | 14,167           |


|                               |        |     |         |         |    |                  |
|-------------------------------|--------|-----|---------|---------|----|------------------|
| ខ្សែខ្មៅ (២ឆ្នាំ)             | គ.ក    | 2   | 7,000   | 14,000  | 6  | 2,333            |
| រោងបណ្តុះកូន (៣ឆ្នាំ)         | រោង    | 1   | 100,000 | 100,000 | 9  | 11,111           |
| ថាសបណ្តុះកូន (២ឆ្នាំ)         | ថាស    | 5   | 2,000   | 10,000  | 6  | 1,667            |
| សំណាញ់បន្ថយកំដៅ (៥ឆ្នាំ)      | ដុំ    | 0.5 | 200,000 | 100,000 | 15 | 6,667            |
| កញ្ចប់ប្រមូលផល (៥ឆ្នាំ)       | កញ្ចប់ | 3   | 25,000  | 75,000  | 15 | 5,000            |
| ធុងបាញ់ថ្នាំ ២០លីត្រ (៣ឆ្នាំ) | ធុង    | 1   | 120,000 | 120,000 | 9  | 13,333           |
| <b>៣-ចំណេញសរុប</b>            |        |     |         |         |    | <b>1,935,611</b> |
| <b>ថ្លៃដើម/គ.ក</b>            |        |     |         |         |    | <b>2,966.13</b>  |
| <b>ចំណេញ/គ.ក</b>              |        |     |         |         |    | <b>3,033.87</b>  |

**៥-លទ្ធភាពចំណេញផ្អែកលើបម្រែបម្រួលទិន្នផល ÷ (ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ)**

- ទិន្នផលទាបបំផុត ៦៥% ឬ ៥៥៣គ.ក/៥០០ដើម
- ទិន្នផលមធ្យម ៧៥% ឬ ៦៣៨គ.ក/៥០០ដើម
- ទិន្នផលខ្ពស់បំផុត ៨៥% ឬ ៧២៣គ.ក/៥០០ដើម

| ទិន្នផល<br>គ.ក | តម្លៃ<br>រៀល/គ.ក | ចំណូល<br>រៀល | ចំណាយ<br>រៀល | ចំណេញ-ខាត |           |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                |                  |              |              | រៀល       | %ធៀបចំណាយ |
| 553            | 6,000            | 3,318,000    | 1,892,389    | 1,425,611 | 75%       |
| 638            | 6,000            | 3,828,000    | 1,892,389    | 1,935,611 | 102%      |
| 723            | 6,000            | 4,338,000    | 1,892,389    | 2,445,611 | 129%      |

**៦-ខ្សែប្រចាំកត់ត្រា៖**



**៧-ហានិភ័យ ៖**

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាផ្ទាល់ពីបទពិសោធន៍លើការដាំដុះត្រសក់ផ្អែមរបស់កសិករនៅស្រុក រតនៈមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង ហានិភ័យដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុលើដំណើរការដាំដុះដែលនាំឱ្យ ទិន្នផលមានការធ្លាក់ចុះ គឺបញ្ហាជំងឺផ្សិត បាត់តេរី និងវីរុស ដោយសារទឹកភ្លៀងនៅដើមរដូវវស្សា។ ដើម្បី កាត់បន្ថយ និងគ្រប់គ្រងបញ្ហាខាងលើនេះ កសិករត្រូវមានវិធានការគ្រប់គ្រងកម្រិតទឹកស្រោចស្រពឱ្យ បានសមស្រប និងប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារជំងឺឱ្យបានទៀតទាត់។

**៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន**

ត្រសក់ផ្អែមជាដំណាំចំណាយដើមទុនច្រើនក្នុងការដាំដុះ ថែទាំ តម្រូវឱ្យកសិករមានការប្រុង ប្រយ័ត្នខ្ពស់លើការគ្រប់គ្រងទឹក ជី សត្វល្អិត និងជំងឺ ហើយបញ្ហាទាំងនេះគឺអាចបំផ្លាញទិន្នផលត្រសក់ ផ្អែមដល់ថ្ងៃប្រមូលផលតែម្តង។ ការគ្រប់គ្រងដំណាំត្រសក់ផ្អែមបានល្អ កសិករនឹងមានលទ្ធភាព ចំណេញ និងជាផលិតផលដែលមានតម្លៃការទីផ្សារច្រើន ឬមានក្រុមហ៊ុនចុះក្នុងត្រាទទួលទិញលក់បន្ត ទៅផ្សារទំនើបផ្សេងៗ។



**ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ៖**

- កសិករដាំដំណាំត្រសក់ផ្អែម ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
- ឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ