



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK
ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមទាវកង្កែប

Raising Muscovy Ducks



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អេ.ឌី.ប៊ី)

ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣



023 220 811
023 220 810
095 416 878

#9-13, Street 7, Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh | info@ardb.com.kh | www.ardb.com.kh

មាតិកា

១- សេចក្តីផ្តើម	១
២-លក្ខណៈទូទៅ.....	១
៣-បច្ចេកទេសវិស្វកម្ម	១
៣-១- ការរៀបចំទីជម្រក.....	១
៣-២- ការជ្រើសរើសពូជ	៣
៣-៣- ការបង្កាត់ពូជ	៣
៣-៤- ការភ្ជាប់ស៊ីតតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ	៤
៣-៥- ការថែទាំកូនទា	៤
៣-៦- ទឹក និងចំណីទា.....	៦
៤- ជីវិត ការការពារ និងការថែទាំក្នុងស្ថានភាពទារក.....	៨
៥- តម្លៃ និងទីផ្សារ.....	៩
៥-១- តម្លៃ.....	៩
៥-២- ទីផ្សារ.....	៩
៥-៣- គម្រោងនៃការចំណាយលើការចិញ្ចឹមទារកក្នុងរយៈពេល ១,០០០ ក្បាល.....	១០
៥-៤- ការប្រមូលផល.....	១០
៦- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច.....	១១
៦-១- ការវិភាគលើតម្លៃលក់ទារកក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ	១២
៦-២- ការវិភាគលើអត្រាបាត់បង់.....	១២
៧- ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍	១៣
៨- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	១៤

១-សេចក្តីផ្តើម

ទាកាប៉ាជាបក្សីមួយប្រភេទងាយស្រួលចិញ្ចឹម ងាយផ្តល់ចំណី ធន់នឹងជំងឺ ធំឆាត់លឿន សាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ដោយក្នុងសាច់មានសារធាតុខ្លាញ់តិចបំផុត និងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់។ ទាកាប៉ាជាសត្វចូលចិត្តលេងទឹកសម្អាតខ្លួន រស់នៅក្បែរប្រភពទឹក និងស្វែងរកចំណីទាំងក្នុងទឹក និងលើគោក ធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់។ ដើម្បីចិញ្ចឹមទាកាប៉ាទទួលបានជោគជ័យ និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ទាមទារឱ្យកសិករចិញ្ចឹមត្រូវគិតគូរពីការធ្វើទ្រុង ការជ្រើសរើសពូជ ការបង្កាត់ពូជ របៀបថែទាំ និងការផ្តល់ចំណីដោយអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយនៃបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដែលជាការចាំបាច់បំផុត។

២-លក្ខណៈទូទៅ

ពូជទាកាប៉ាដែលចិញ្ចឹមសម្រាប់ផលិតកម្មសាច់ហៅជាភាសាអង់គ្លេស Barbary Duck ចំណែកឯ Muscovy Duck សំដៅលើទាំងពូជទាកាប៉ាព្រៃ និងទាកាប៉ាស្រុក។ ទាកាប៉ាពេញវ័យនៅអាយុ៥ខែ ទៅ៦ខែ។ ទាកាប៉ាល្មោលអាចមានទម្ងន់ជាង៦គ.ក្រ ឯទាញីអាចមានទម្ងន់ជាង៣គ.ក្រ។ ទាកាប៉ាមានច្រើនពណ៌ ដូចជា ពណ៌ខ្មៅ ស ប្រផេះ ត្នោត ឬពណ៌គគីរ ហើយទាមួយក្បាលអាចមានច្រើនពណ៌។ ទាកាប៉ាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ គ្មានសម្លេងរំខាន នៅតាមមាត់បឹង និងចូលចិត្តលេងទឹក ហើយអាចបង្កាត់ពូជបានចាប់ពីអាយុ៧ខែឡើងទៅ។ ទាឈ្មោលច្រើនធំជាងមេ ទាឈ្មោលមានមាឌធំៗមិនអាចហើរឆ្ងាយបានទេ តែមេអាចហើរបានឆ្ងាយជាងទាឈ្មោល។ ទាកាប៉ាមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីពូជទាដទៃទៀតដូចជា៖ អាចហើរបានទាញីពងដាក់សម្បុកនៅក្នុងទ្រុង និងមានការចងចាំសម្បុកយ៉ាងច្បាស់។ មេទាកាប៉ាមួយក្បាលអាចមានលទ្ធភាពក្រាបស៊ូតរហូតដល់២០គ្រាប់ និងភ្ជាស់កូនមានរយៈពេល៣៥ថ្ងៃ។ សាច់ទាកាប៉ាមានខ្លាញ់តិចជាងប្រភេទទាផ្សេងៗទៀត ។

៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

៣-១-ការរៀបចំទីស្នាក់នៅ

ក)-មានប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

- មានសុវត្ថិភាពការពារពីសត្វកាច់ផ្សេងៗ
- ការពារមិនឱ្យទាកាប៉ាចេញទៅស៊ីបំផ្លាញច្បារដំណាំក្នុងកសិដ្ឋាន
- កាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺពីខាងក្រៅ
- ស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង (ការផ្តល់ចំណី ការផ្តល់ភ្នាក់ងារ...)
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផល

ខ)-ការសាងសង់ទ្រុង៖

- សង់ទ្រុងពីសម្ភារៈងាយៗស្រួលរក
- ទីតាំងស្រួលថែទាំ ទូលាយ ដីមិនស្អិត មិនដក់ទឹក និងមិនមានទឹកហូរឆ្លងកាត់
- មានប្រភពទឹកស្អាត និងមានចំណីធម្មជាតិនៅក្បែរ ដូចជាស្មៅ ត្រកួន និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗ
- មានម្លប់ជ្រក និងការពារពីខ្យល់បក់ខ្លាំង
- សង់ទ្រុងមានទទឹង ១០ម៉ែត្រ បណ្តោយ ៣០ម៉ែត្រឡើងទៅ និងមានដំបូលកម្ពស់ពីដី ៣ម៉ែត្រ (ករណីចិញ្ចឹមទាកាប៉ាពី ១,០០០ក្បាល ទៅ ១,៥០០ក្បាល) ។ ជាទូទៅទាកាប៉ាចូលចិត្តដេកនៅលើ ធ្នើរ ដូចនេះគួររៀបចំធ្នើរមានកម្ពស់ទាបៗផុតពីដី កម្ពស់អាចចាប់ពី ០,៥ម៉ែត្រឡើងទៅ។



គ)-ការរៀបចំអាងទឹកសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ទាកាប៉ា

ករណីកន្លែងចិញ្ចឹមទាកាប៉ាមិនមានត្រពាំង ឬស្រះទឹកនោះកសិករត្រូវតែរៀបចំអាងទឹកដោយពុះ ធុងជ័រជាពីរ ឬបានដែកដាក់ទឹកឱ្យទាកាប៉ាលេង និងសម្រាប់លាងសម្អាតខ្លួនជាប្រចាំថ្ងៃ។
(គួរប្តូរទឹកចេញ១ទៅ២ ដង/ថ្ងៃ ដោយមើលទៅលើភាពកង្វក់របស់ទឹក ដើម្បីទាកាប៉ាមានសុខភាពល្អ)




ជីកមាត់អាងខាងលើក្នុងទំហំទទឹង និងបណ្តោយចាប់ពី១ម៉ែត្រ និងផ្ទៃបាតស្រះធ្វើរាងជម្រាលមុំ ៤៥ដឺក្រេ ជម្រៅ០,២៥ ទៅ០,៣ម៉ែត្រ។

៣-២-ការជ្រើសរើសពូជទាកាប៉ា

កត្តាសំខាន់ៗនៃការជ្រើសរើសពូជទាកាប៉ា ៖

- មានមាឌធំ និងដងខ្លួនវែង
- ចលនារឹងប៉ឹងស្លាហាប
- មានរោម ស្លាបល្អភ្លឺរលោង និងភ្នែកភ្លឺថ្លាល្អ
- ដើងមានទ្រង់ទ្រាយល្អ មិនមានស្នាមរបួស
- ពូកែស៊ីចំណី និងជីកទឹក
- ផលិតស៊ីតបានច្រើន
- មិនមានជម្ងឺ ឬមិនធ្លាប់កើតជម្ងឺឆ្លង




ប្រភេទទាកាប៉ា (Cairine Moschata) ជាពូជទាដែលល្អជាងគេសម្រាប់ផលិតកម្មសាច់។ ទាកាប៉ា ឈ្មោលអាចមានទម្ងន់ពី៤,៦ ទៅ៦,៨គីឡូក្រាម/ក្បាល និងទាញីអាចមានទម្ងន់ពី ២,៧ទៅ៣,៦គីឡូក្រាម/ក្បាល ហើយអាចផលិតស៊ីតមធ្យម ៦០ទៅ១២០គ្រាប់/ឆ្នាំ។ កូនទាកាប៉ាមានភាពរឹងមាំងាយស្រួលចិញ្ចឹម។ ទាកាប៉ាប្រភេទនេះចូលចិត្តស៊ីស្មៅ និងដើររកចំណីនៅតាមវាលក្បែរៗផ្ទះ។

៣-៣-ការបង្កាត់ពូជទាកាប៉ា

ត្រូវជ្រើសរើសទាកាប៉ាសម្រាប់ទុកធ្វើពូជនៅអាយុ ៦ទៅ ៧សប្តាហ៍ ដែលមានទំហំធំជាងគេក្នុងសម្បុក ២ទៅ៣ ក្បាល។ ទាអាចចាប់ផ្តើមបង្កាត់ពូជពីអាយុ៧ ទៅ ៨ខែ។ មេទាកាប៉ាផ្តល់ស៊ីតពីអាយុ៧ខែឡើងទៅ។

- ទាកាប៉ាមេ១ក្បាលអាចភ្ជួរកូនបានពី ១២ ទៅ ១៥ ក្បាល/លើក
- ត្រូវដាក់បង្កាត់មេទាពី៥ ទៅ៦ក្បាល ជាមួយទាកាប៉ា ឈ្មោល ១ក្បាល
- ប្តូរបារាំងរាល់១ឆ្នាំម្តងជៀសវាងការជាន់ឈាម
- កាត់រោមស្លាបរឹង(រំលងមួយៗ)របស់ទាកាប៉ាចេញ ដើម្បីកុំឱ្យហើរ ពិសេសទាដែលមានទម្ងន់ស្រាល ឬស្គមៗ។



៣-៤-ការភ្ជួរស៊ីតនាការងារក្នុងគ្រួសារ: ធម្មជាតិ

-ការរៀបចំសម្បកពងទាកាប៉ា

មេទាកាប៉ាក្រាប និងភ្ជួរស៊ីតដោយខ្លួនឯង។ កសិករចិញ្ចឹមត្រូវរៀបចំសម្បកឱ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ និងមានភាពកក់ក្តៅដោយ៖

- ត្រូវរៀបចំដោយប្រើចំបើង សម្បកកេស ឬកម្ទេចឈើ ដាក់ក្រាលពីក្រោមដើម្បីកុំឱ្យកម្ដៅសាយ ភាយចេញ និងការពារខ្យល់ប៉ះផ្ទាល់ទៅនឹងស៊ីត ដែលនាំឱ្យស៊ីតបាត់បង់កម្ដៅដែលផ្តល់ពីមេទា
- សម្បកគួរធ្វើពីចំបើងស្អួត ហើយមាត់សម្បកត្រូវរៀបចំជាមូរជុំវិញ
- ស៊ីតក្នុងសម្បកមិនត្រូវដាក់នៅចំពីក្រោមកម្ដៅថ្ងៃ ឬសើមឡើយ
- សម្បកត្រូវស្អាត (មិនប្រឡាក់) ស្អួត កក់ក្តៅ និងទំហំល្មមសម្រាប់ទាក្រាប
- ចរិតពីធម្មជាតិរបស់ទាកាប៉ាចូលចិត្តក្រាបពងនៅលើកម្រាលទ្រុងផ្ទាល់ដី កន្លែងមិនសូវមានពន្លឺ ស្ងប់ស្ងាត់ និងមានសុវត្ថិភាព
- មេទាផ្តល់ស៊ីតនៅពេលព្រឹកព្រលឹម ឬពេលយប់
- ពេលកំពុងក្រាបភ្ជួរស៊ីត កសិករត្រូវដាក់ចំណី និងទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមេទាកាប៉ា កុំឱ្យមេទាកាប៉ា ចេញឆ្ងាយពីសម្បកយូរពេកបណ្តាលឱ្យស៊ីតត្រជាក់ និងញាស់មិនបានច្រើន
- កូនទាកាប៉ាចំណាយពេល២ទៅ៣ថ្ងៃសម្រាប់ចោះសំបក និងញាស់ ដូច្នេះមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ ជួយបកសំបកពេកនោះទេ។



៣-៥-ការថែទាំកូនទាកាប៉ា

- កូនទាកាប៉ាទើបញាស់ត្រូវការផ្តល់កម្ដៅបន្ថែម ទឹក ចំណី និងមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អ
- មិនត្រូវឱ្យកូនទាកាប៉ាតូចៗអាយុក្រោម៨ថ្ងៃ ចូលលេងទឹកក្នុងអាង
- កូនទាកាប៉ាអាយុលើសពី៨ថ្ងៃ អាចដាក់ឱ្យលេងទឹកយូរបំផុត ២ទៅ៣នាទីប៉ុណ្ណោះ តែកុំឱ្យលេង ទឹករហូតដល់រងារញ័រញ៉ាក់

- កូនទាប៉ាមានអាយុក្រោម ២សប្តាហ៍ត្រូវថែរក្សាឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងរៀបចំសម្រាប់ដាក់កូន ទាប៉ាតូចៗឱ្យបានកក់ក្តៅ។
- មិនត្រូវឱ្យកូនទាប៉ានៅក្រោមទឹកភ្លៀងទេ ព្រោះកូនទាប៉ាមានអាយុក្រោម ៣ទៅ៤សប្តាហ៍ពុំអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុបាន។
- ត្រូវផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដូចជា អំពូលភ្លើង ឬក្នុងផ្សង នៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងធម្មតា
- កូនទាប៉ាអាយុចាប់ពី ៣ទៅ៤ខែឡើងអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់អាកាសធាតុអាក្រក់បាន
- ដាក់កូនទាប៉ាក្នុងទីធ្លាចិញ្ចឹម និងកន្លែងដេកស្របទៅតាមមាឌ អាយុ និងទំហំដងខ្លួន



បរិមាណដងស៊ីតេទាប៉ាដាក់ចិញ្ចឹម

បរិមាណអតិបរមានៃដងស៊ីតេទាប៉ាដាក់ចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុង (ដេកយប់) មានទីធ្លាបិទជិតគឺ៖

អាយុទាប៉ា (សប្តាហ៍)	ដងស៊ីតេ (ក្បាល)/ម៉ែត្រការ៉េ
អាយុក្រោម ១សប្តាហ៍	៥០
អាយុចន្លោះពី ១ ទៅ៤សប្តាហ៍	២០
អាយុចន្លោះពី ៤ ទៅ៨សប្តាហ៍	៨
អាយុចាប់ពី ៨សប្តាហ៍ឡើង	៥
មេបាពូជ	៤

៣-៦-ទឹក និងចំណីអាហារ

តម្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ទាសកប៉ាកមិនខុសគ្នាពីបក្សីផ្សេងៗផងដែរ ដើម្បីលូតលាស់ ធំធាត់ បន្តពូជ ទាសត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗដូចជា៖ ទឹក ប្រូតេអ៊ីន ថាមពល វីតាមីន និងសារធាតុដុំ ដែលមាននៅក្នុង បន្លែបៃតង គ្រាប់ធញ្ញជាតិ សំបកក្តាមខ្យង ខ្មៅ ដង្កូវ និងសត្វល្អិតផ្សេងៗ។ល។

ក-តម្រូវការទឹក

ទឹកមានសារៈសំខាន់ចូលរួមជួយដំណើរឈាមរត់ បង្កើនផលិតកម្មស៊ីត និងការលូតលាស់។ ទឹកធ្វើឱ្យចំណីទន់ និងជួយរំលាយអាហារ ការស្រូប និងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមទៅគ្រប់សរីរាង្គ។ ទាពេញវ័យត្រូវការផឹកទឹកមិនតិចជាង២លីត្រ/ក្បាល ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។



ចំណាំ៖ ទាសកប៉ាកផឹកទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្តាលឱ្យ

ការរំលាយអាហារមិនបានល្អ ផលិតកម្មស៊ីតថយចុះយ៉ាងរហ័ស មិនមានភាពស្លាហាប រហ័សរហួន។

ខ-ចំណីកូនទាសកប៉ាក (អាយុពី ១ថ្ងៃ-២សប្តាហ៍)

- ការផ្តល់ចំណីដល់កូនទាសកប៉ាកតូចៗត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូនទាញដោះបាន ២៤ម៉ោង
- ត្រូវផ្តល់ចំណីក្រុមហ៊ុន (ចំណីកូនទា ឬកូនមាន់ដែលមានប្រូតេអ៊ីនពី ២០ ទៅ២២% និងត្រូវផ្តល់ទឹកស្អាតជានិច្ច
- កូនទាចូលចិត្តចំណីស្បែកដូចជា អង្ករ កន្ទក់ បន្លែបៃតង ឬ រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក និងចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនមួយចំនួនទៀតដូចជា កំណាត់ជន្លេន ខ្យងខ្មៅ កូនត្រី ។ល។

គ-ការផ្តល់ចំណីដល់កូនទាសកប៉ាក (អាយុពី២-៤សប្តាហ៍)

- អាចផ្តល់ចំណីកូនទាបន្ត ព្រោះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវាពុំទាន់មានភាពរឹងមាំពេញលេញនៅឡើយ
- ចំណីមានគ្រាប់ល្អិតៗ និងដាក់ទឹកឡើង ឬអាចលាយបន្លែម្រុកជាតិបៃតង ឬស្លឹកបន្លែនានា។
- លាយចំណីកូនទាពាក់កណ្តាល និងចំណីរកបានក្នុងភូមិពាក់កណ្តាល។



កូនទាសកប៉ាកអាយុ២៥ថ្ងៃ ឈ្មោលតែងលូតលាស់ធំជាងញី កូនទាសកប៉ាកលេខ(១និង២)ឈ្មោល ចំណែកលេខ(៣ និង៤)ញី

ឃ-ការផ្តល់ចំណីដល់ទាតាប៉ាសាច់ (អាយុលើសពី ៤សប្តាហ៍)

ទាតាប៉ាជំទង់ និងពេញវ័យត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប្រមាណ ១៦% ទៅ២០% មានច្រើនរបៀបក្នុងការផ្សំ ចំណីសម្រាប់ទាតាប៉ាសាច់ ៖

-**របៀបទី១**៖ ប្រើកន្ទក់ ១០០គីឡូក្រាម លាយជាមួយមេចំណីជ្រូកសាច់១០គីឡូក្រាម ករណីមាន កូនត្រីល្អិត បន្លែ ឬកាកសំណល់ផ្ទះបាយអាចបន្ថែម ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមចំណី និងបង្កើនសារធាតុ ចិញ្ចឹមជួយឱ្យទាតាប៉ាឆាប់ធំធាត់ផងដែរ។

-**របៀបទី២**៖ ផ្សិតសមាសធាតុរួមផ្សំច្រើនប្រភេទ ដែលងាយស្រួលស្វែងរកក្នុងភូមិដូចជា ចុងអង្ករ កន្ទក់ ពោត កាកស្រាបៀរ កូនដង្កូវ ជន្លេន ខ្យងខ្មៅ ក្បាលត្រីឬត្រីនុយ បន្លែបៃតង ឬរុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក ។ល។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះគួរលាយចំណីប្រាំក្រមហ៊ុន ១/៣ និងចំណីរកបានក្នុងភូមិ ២/៣។

ង-ចំណីមេបាពូជ

អាហារទាតាប៉ាចូលចិត្តស៊ីជាចម្បងគឺ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ បន្លែបៃតង ស្មៅ កាកសំណល់បន្លែពីផ្ទះបាយ មើម កូន ពន្លករុក្ខជាតិដែលដុះនៅលើគោក ឬក្នុងទឹក និងប្រភេទអាហារដែលមានជាតិសាច់មួយចំនួនដូចជា កូនត្រី កូនកង្កែប ខ្យង ដង្កូវ រុយ មូស ជន្លេន និងសត្វល្អិតៗនានា។

ទាតាប៉ាត្រូវការចំណីដែលមានគ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗ ៖

- ចំណីថាមពល (ជាតិម្សៅ ប្រេង ខ្លាញ់) ដូចជា៖ មើមដំឡូងមី ពោត ចុងអង្ករ ត្រាវ ដំឡូង កន្ទក់ ស្រូវ ស្កររង្វរ។ល។
- ប្រូតេអ៊ីន (ជាតិសាច់) ដូចជា៖ ស្មៅខ្ចី បន្លែ ដំណាំចំណីសត្វ រុក្ខជាតិតូចៗដុះក្នុងទឹក កូនត្រី ខ្យង ខ្មៅ ក្តាម កំពិស ម្សៅត្រី ជន្លេន... ។ល។
- វីតាមីន សារធាតុរ៉ែ និងទឹក។

រូបមន្តផ្សំចំណីទាតាប៉ា ៖ សម្រាប់ដំណាក់កាលលូតលាស់ខុសៗគ្នាក្នុងបរិមាណ១០០ គ.ក្រ

សមាសភាពធាតុផ្សំចំណី	អាយុពី១ថ្ងៃ ដល់៦សប្តាហ៍	មានអាយុលើស ៦សប្តាហ៍	ត្រៀមលក់ ឬ ទាតាប៉ាពង
ពោតក្រហម	៤៥	៤០	៤០
កន្ទក់	២៥	៣៣	៣៣
កាកដូង	៣	១០	៥
ម្សៅស្លឹកកន្ទ្រីចេត	៣	៨	៥
ម្សៅបង្ការ	២៣	៨	១៦
អំបិល	០.៥	០.៥	០.៥

ប្រមិច (វិភាគនិងសារធាតុរ៉ែ)	០.៥	០.៥	០.៥
សរុប	១០០	១០០	១០០

ក្រៅពីនោះ អាចធ្វើការរៀបចំបង្កើតសមាធាតុផ្សំចំណីបន្ថែមសម្រាប់ទាកប៉ាដូចជា៖

- បង្កើតស្ថនបន្លែ ត្រកួន ផ្កា និងស្មៅ
- ដាំប្រភេទបន្លែទ្រើងពីលើទីធ្លាទាកប៉ាដើរលេង (ននោងជ្រុង ននោងមូល ឃ្លោក ម្រះ។ល។)
- ដាំចកអាសូឡា ឬចកបាយទាកក្នុងស្រះ ឬអាងស៊ីម៉ង់ដ៍
- ចិញ្ចឹមជន្លេនក្រហម

៤-ជំងឺ ការការពារ និងការថែរក្សាសុខភាពទាកប៉ា

ជំងឺតែងជួបប្រទះលើទាកប៉ា

ក-ជំងឺអាសន្នរោគ៖ កើតឡើងលើទាកប៉ាគ្រប់វ័យ

រោគសញ្ញា៖

- ដំណើរលឿយៗ និងខ្សោយកម្លាំង
- មិនសូវស៊ីចំណី ស្រេកទឹកខ្លាំង
- ទាកប៉ាត្រូវវិក្កាលញឹកញាប់ និងរាគពណ៌លឿងខ្ចីលាយជាមួយទឹក
- ភ្នែកសើម និងច្រមុះមានស្នេស
- អត្រាបាត់បង់ចន្លោះពី ៥%ទៅ៣៥% ឆ្លងរហ័សតាមរយៈស្នេស និងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់រវាងទាយី

និងទាជារស់នៅក្នុងហ្វូងតែមួយ

វិធីសាស្ត្រការពារនិងព្យាបាល ៖

- ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគ (ចាក់សាច់ដុំទ្រូង)លើកូនទាកប៉ាអាយុបាន២ ទៅ៣សប្តាហ៍
- វ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគលើកទី២ ចាក់ក្រោយលើកទី១ រយៈពេល២១ថ្ងៃក្រោយ និងរំលឹកវ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគ រៀងរាល់៥ខែម្តង(សម្រាប់ទាកប៉ាទុកពូជ)

- ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ ដោយសារមេរោគវិក្កាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ខ-ជំងឺប៉េស្តូទាកប៉ា ៖

ជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងរោគសញ្ញាជំងឺអាសន្នរោគដែរ តែមានចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដូចជាហ្វូងទាងាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំនួនច្រើន។

រោគសញ្ញា៖

- ខ្សោយកម្លាំង និងដំណើរខ្លីច្រើនដោយគ្មានការហើម ឬឡើងកម្ដៅត្រង់សន្លាក់
- មានហូរទឹកភ្នែក និងរោមជុំវិញភ្នែកមានជាប់ពុះទឹក
- ក្បាលខិនចុះក្រោម និងធ្លាក់ស្លាប មិនអាចហើរបាន

វិធីសាស្ត្រការពារនិងព្យាបាល៖

- ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺប៉េស្តូទាកាប៉ា (ចាក់សាច់ដុំភ្លៅ) ÷
- ចាក់លើកូនទាកាប៉ាអាយុ ៤សប្តាហ៍ និងរំលឹករៀងរាល់៥ខែម្តង
- ចំណាំ៖**ជម្ងឺប៉េស្តូទាកាប៉ាជាប្រភេទវីរុសពុំមានថ្នាំព្យាបាលទេ

ក-ជំងឺបង្កឡើងដោយពួកបរាសិត

- បរាសិតដែលតែងកើតលើទាកាប៉ាចែកចេញជា២ប្រភេទគឺ៖ **បរាសិតខាងក្រៅនិងបរាសិតខាងក្នុង**

➢ **បរាសិតខាងក្នុងមានដូចជា៖** Flukes Tapeworms Roundworms Coccidia Hairworms
Gizzard worms និង Intestinal worms

➢ **បរាសិតខាងក្រៅមានដូចជា៖** Duck lice និង Gapeworms

ដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាបរាសិតខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ កសិករអាចអនុវត្តន៍វិធានការដូចខាងក្រោម៖

- សម្អាត និងធ្វើអនាម័យកន្លែងរស់នៅរបស់ទាកាប៉ាជាប្រចាំ
- ប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
- ថែរក្សាសត្វឱ្យមានសុខភាពល្អតាមរយៈការផ្តល់ចំណីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់
- ជៀសវាងឱ្យបក្សីព្រៃចូលមកទីធ្លាចិញ្ចឹមទាកាប៉ា
- អាចប្រើប្រាស់ថ្នាំទម្លាក់បរាសិតដោយលាយច្របល់ជាមួយចំណីមានដូចជា ÷ Fenbendazole, Albendazole, Ivermectin...
- ផ្តល់ជាលើកដំបូងលើកូនទាកាប៉ាអាយុបាន ២ខែ ដោយយកថ្នាំលាយច្របល់ជាមួយចំណីទា។

៥-តម្លៃ និងទីផ្សារ

៥-១-តម្លៃ៖ ជាធម្មតាល្បាយប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃបោះដុំថេរពេញមួយឆ្នាំគឺ ១០,០០០រៀល/គ.ក្រ និងលក់រាយក្នុងស្រុកតម្លៃ ១២,០០០រៀល/គ.ក្រ។

៥-២-ទីផ្សារ៖ កសិករអាចលក់ទាកាប៉ាសាច់រស់ចេញទៅល្បាយកណ្តាលដែលមកយកដល់កសិដ្ឋានទៅលក់បន្តនៅភ្នំពេញ និងចែកចេញតាមទីប្រជុំជន និងទីផ្សារ។

៥-៣-គម្រោងនៃការចំណាយលើការចិញ្ចឹមទាសាច់ ១,០០០ក្បាល/ឆ្នាំ

គម្រោងចិញ្ចឹមទាសាច់នេះត្រូវបានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃធនាគារ អេ.អ.ឌី.ប៊ី ចុះសិក្សា នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាសាច់ នៅភូមិត្រពាំងចាន់ ឃុំត្រពាំងចាន់ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

- ទំហំផ្ទៃកសិដ្ឋានសរុប ÷ ០,៥ហិកតា
 - ចំនួនរុក្ខ/ឆ្នាំ ÷ ៣រុក្ខ/ឆ្នាំ (១រុក្ខប្រើពេល៣ខែ និងទុកទ្រង់ឱ្យទំនេរកន្លះខែទៅ១ខែ ដើម្បីសម្អាត)
 - ទំហំទ្រង់ ÷ ទទឹង១០ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ៣០ម៉ែត្រ
- ទុនចំណាយពេលចាប់ផ្តើម÷ ៣៣,០៨០,០០០រៀល ក្នុងនោះរួមមាន÷

ចំណាយវិនិយោគលើការរៀបចំទ្រង់ របង និង ឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ (រៀល)	ចំណាយលើការចិញ្ចឹម-ថែទាំ (ចំណី និងថ្នាំ) (រៀល)	ចំណាយសរុប (រៀល)
12,480,000	20,600,000	33,080,000

៥-៤-ការប្រមូលផលទាសាច់៖

- ដោយផ្អែកលើនិន្នាការតម្លៃ និងអត្រាស្លាប់កូនទាសាច់អាយុក្រោមអាយុ១៤ថ្ងៃ
- ទាសាច់ចំណាយរយៈពេលចិញ្ចឹមជាង៣ខែ។ ទាសាច់មានទម្ងន់ពី២ទៅ២,៨គ.ក្រ/ក្បាល រីឯទាសាច់ឈ្មោលអាចមានទម្ងន់ពី៣ទៅ៤គ.ក្រ/ក្បាល (ជាមធ្យមទម្ងន់ទាសាច់ ៣គ.ក្រ/ក្បាល) ។
 - អត្រាបាត់បង់មធ្យមអាចមានចន្លោះពី ៤% ទៅដល់១០% គឺអាស្រ័យលើការថែទាំ ចំណី ទឹក និងពូជ
 - អត្រាបាត់បង់អាចមានរហូតដល់៥០% ករណីផ្ទុះជំងឺនៅពេលកូនទាសាច់អាយុក្រោម១៤ថ្ងៃ ។
 - តាមរយៈការសិក្សា កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាសាច់មានអត្រាបាត់បង់ ៦%
 - សម្គាល់៖ ការចិញ្ចឹមទាសាច់ក្នុង១រុក្ខមានរយៈពេលជាង៣ខែជាង ដោយទុកចន្លោះរយៈពេល១ខែ ដើម្បីសម្អាតទ្រង់ និងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគ មុនដាក់កូនទាសាច់ថ្មីចូល ដូច្នេះអាចចិញ្ចឹមបានចំនួន៣រុក្ខ/ឆ្នាំ។

៦-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច៖ លើការចិញ្ចឹមទាសាច់ចំនួន ១,០០០ក្បាល / វត្ត៖

- ទម្ងន់ជាមធ្យម ៣គ.ក្រ/ក្បាល

- តម្លៃជាមធ្យម ១០,០០០រៀល/ គ.ក្រ

ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការចិញ្ចឹមទាសាច់ របស់កសិករនៅ ឃុំត្រពាំងចាន់ ស្រុកបរិមូល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង						
បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់ សរុប (រៀល)	ចំនួនសា រិលស	ទឹកប្រាក់ សរុប (រៀល)
១-ចំណូលសរុប/វត្ត						28,200,000
ចំណូលពីការលក់ទាសាច់	ក្បាល	940	30,000	28,200,000		28,200,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ						20,927,417
២.ក. ចំណាយប្រែប្រួល						20,600,000
កូនទាសាច់	ក្បាល	1,000	4,000			4,000,000
កន្ទក់	គ.ក្រ	10,000	1,100			11,000,000
ចំណីកូនមាន់	គ.ក្រ	30	2,333			70,000
ចំណីកូនទា	គ.ក្រ	300	2,000			600,000
មេចំណីជ្រូកសាច់	គ.ក្រ	990	3,500			3,465,000
ថ្លៃអគ្គីសនី	គី.វ៉ាត់	100	730			73,000
ថ្នាំនិងវិវាស	គ.ក្រ	2	24,000			48,000
វ៉ាក់សាំងប៉េស្ត	ដប	1	20,000			20,000
វ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគ	ដប	1	80,000			80,000
កម្លាំងពលកម្ម	ខែ	3	400,000			1,200,000
ថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិត	កញ្ចប់	1	20,000			20,000
ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ	ដប	1	24,000			24,000
២.ខ. ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ				12,480,000		327,417
រោងទាសាច់ (ទទឹង១០ ម៉ែត្រ បណ្តោយ៣០ម៉ែត្រ)	រោង	12,000,000	1	12,000,000	45	266,667
សំណាញ់ព័ទ្ធជុំវិញ បរិមាណទ្រុងមេបា	គ.ក្រ	10	25,000	250,000	30	8,333

កម្រាល (ចំបើង ឬអង្កាម)	ដុំ	1	5,000	5,000	1	5,000
ស្រកទឹក	ចំនួន	2	80,000	160,000	30	5,333
ស្រកចំណី	ចំនួន	10	2,500	25,000	12	2,083
អំពូលកម្ដៅ	ចំនួន	10	4,000	40,000	1	40,000
៣-ចំណេញសរុប						7,272,583
ថ្លៃដើមចំណាយលើទំនាក់ទំនងមួយក្បាល						22,263
ចំណេញលើទំនាក់ទំនងមួយក្បាល						7,737

ប្រភព៖ ចុះសាកសួរកសិករចិញ្ចឹមទាតាប៉ាផ្ទាល់នៅឃុំត្រពាំងចាន់ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៦-១-ការវិភាគលើតម្លៃលក់ទាតាប៉ាសាច់រាង២៣ខែ

<u>ចំនួនទាតាប៉ា</u>	<u>ទម្ងន់/ក្បាល</u>	<u>ទម្ងន់សរុប</u>	<u>តម្លៃ/គ.ក្រ</u>	<u>ចំណូលសរុប</u>	<u>ចំណាយសរុប</u>	<u>ចំណេញសរុប</u>
940	3	2,820	9,000	25,380,000	20,927,417	4,452,583
940	3	2,820	10,000	28,200,000	20,927,417	7,272,583
940	3	2,820	11,000	31,020,000	20,927,417	10,092,583
940	3	2,820	12,000	33,840,000	20,927,417	12,912,583

៦-២-ការវិភាគនៅលើអត្រាបាត់បង់(៤%, ៦%, ១២%, ២៥%, ៥០%)

<u>អត្រាបាត់បង់ (%)</u>	<u>ចំនួន (ក្បាល)</u>	<u>ទម្ងន់មធ្យម /ក្បាល (គ.ក្រ)</u>	<u>ទម្ងន់សរុប (គ.ក្រ)</u>	<u>តម្លៃ/គ.ក្រ (រៀល)</u>	<u>ចំណូលសរុប (រៀល)</u>	<u>ចំណាយសរុប (រៀល)</u>	<u>ចំណេញសរុប (រៀល)</u>
4	960	3	2,880	10,000	28,800,000	21,249,438	7,550,562
6	940	3	2,820	10,000	28,200,000	20,927,417	7,272,583
12	880	3	2,640	10,000	26,400,000	19,961,353	6,438,647
25	750	3	2,250	10,000	22,500,000	17,868,215	4,631,785
50	500	3	1,500	10,000	15,000,000	13,842,949	1,157,051

កំណត់សម្គាល់៖ ការចំណាយសរុបប្រែប្រួលដោយបរិមាណចំណីថ្នាំចុះទៅតាមអត្រាបាត់បង់កូនទាតាប៉ាអាជ្ញាធរក្រោម២សប្តាហ៍

៧-ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍៖

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាឃើញថាកសិដ្ឋានអាចជួបនូវហានិភ័យមួយចំនួនដោយថាហេតុលើដំណើរការចិញ្ចឹមទាតាប៉ាដែលនាំឱ្យបង្កផលវិបាក និងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផលិតកម្ម ដូចនេះកសិករគួររៀបចំផែនការជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ហានិភ័យទាំងនោះមាន៖

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ការពិពណ៌នាពីហានិភ័យ	វិធានការ និងអនុសាសន៍
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	កូនទាតាប៉ាដែលមានជំងឺតូចៗពីមេបា និងកូនទាតាប៉ាដែលមានសុខភាពខ្សោយ ដឹកជញ្ជូនយូរពេក	-សិក្សាប្រវត្តិពីកសិដ្ឋានលក់ពូជឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមេបាពូជ -ត្រូវរើសកូនទាតាប៉ាដែលមានសុខភាពល្អមានទំហំប៉ុនៗគ្នា មានរោមភ្លឺរលោង មិនស្លឹកជើង -សន្ទាក់ជើងល្អ ដំណើរហើយរហូន សំឡេងលឺច្បាស់ -មានកែវភ្នែកភ្លឺថ្លា -តាមដានទម្ងន់មេបា និងប្រវត្តិដើមនៃការបង្កាត់ពូជ។
		កង្វះខាតទីធ្លាដាំស្មៅ ពុំមានស្រះទឹកសម្រាប់ទាហែល លេង និងខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹក	-រៀបចំដាំស្មៅឱ្យបានច្រើនប្រភេទពិសេសស្មៅកម្ពស់ទាបជាងកន្លះម៉ែត្រ មានស្លឹកទន់ ប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ លើផ្ទៃដីដែលមានទំហំសមាមាត្រនឹងចំនួនទាតាប៉ា -មានរៀបចំស្រះទឹកសម្រាប់ទាតាប៉ាហែលលេង -មានទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកគ្រប់គ្រាន់ប្រចាំ -រៀបចំកម្រាលទ្រុងស្នូតល្អ ពិសេសពេលកូនទាតាប៉ានៅតូច
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	តម្លៃទីផ្សារទាតាប៉ាប្រែប្រួល មិនច្បាស់លាស់ ដោយមានការប្រកួតប្រជែង ជាពិសេសពីប្រទេសជិតខាង	-ស្វែងរកទីផ្សារ ឬឈ្មួញប្រមូលទិញឱ្យបានច្រើនកន្លែង -ស្វែងរកហាង រោងនីយដ្ឋានដែលមានតម្រូវការជាប្រចាំ និងលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់លាស់ -រកទីផ្សារលក់រាយក្នុងតំបន់នៅអ្នកបរិភោគផ្ទាល់
៣	ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ	ខ្វះថវិកានៅក្នុងដំណើរការចិញ្ចឹម	-មានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ -មានទុនបម្រុងក្រៅពីទុនវិនិយោគ

		ពេលខ្លះត្រូវបង្ខំ ចិត្តលក់ក្នុងរដូវ កាលដែលទាមាន តម្លៃទាប	- ត្រូវរកទុនឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ - កំណត់បរិមាណទាដែលត្រូវចិញ្ចឹមទៅតាមទំហំទុន - ដាក់ទាកប៉ាចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងនូវបរិមាណសមស្រប ដោយដាក់ ចិញ្ចឹមវិលជុំជា៣ទ្រុង ១ខែដាក់មួយទ្រុងដើម្បីមានទុនបង្វិល លឿន
៤	ហានិភ័យ បរិស្ថាន	មានក្លិនស្អុយ សាយភាយទៅអ្នក រស់នៅជិតខាង	- ត្រូវចិញ្ចឹមនៅក្នុងចម្ការ ឬឆ្នាយផ្ទះប្រជាជនរស់នៅ - ត្រូវធ្វើអនាម័យជាប្រចាំ និងរៀបចំប្រព័ន្ធដីវសុវត្ថិភាព

៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ទាកប៉ាជាបក្សីធំជាងលឿន ធន់ខ្លាំងទៅនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ ងាយស្រួលចិញ្ចឹម និងផ្តល់ចំណី
ព្រមទាំងមានទីផ្សារល្អទាំងបោះដុំនិងលក់រាយ។ តាមការចុះសិក្សាជាក់ស្តែងការចិញ្ចឹមទាកប៉ារបស់កសិករ
នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លើការចិញ្ចឹមទាកប៉ាសាច់ ១,០០០ក្បាល ដោយប្រើពេល៣ខែ/វគ្គ ទទួលបានទម្ងន់ជា
មធ្យម ៣គ.ក្រ/ក្បាល ស្មើនឹង ៣០,០០០រៀល/ក្បាល ដោយចំណាយថ្លៃដើមផលិត២២,៣០០រៀល/ក្បាល
ទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ ៧,៧០០រៀល/ក្បាល។ ក្នុង ១វគ្គកសិករអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាង
៧លានរៀល ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញអាចលើសឬតិចជាងនេះអាស្រ័យលើអត្រាបាត់បង់ និងការកាត់បន្ថយ
ចំណាយលើចំណីតាមរយៈការប្រើប្រាស់កាកសំណល់ផ្ទះបាយ និងការប្រមូលបន្លែចាស់ៗតាមផ្សារមកកែច្នៃ
ជាចំណីបន្ថែម។ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន កសិករគួរគិតគូរលើកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដូចជា ការ
ជ្រើសរើសពូជ ការថែទាំដោយធ្វើអនាម័យស្អាតទឹក ចំណី និងអាងទឹកសម្រាប់ទាចុះសម្អាតខ្លួន ប្រភពចំណី
ក្នុងតំបន់ដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃទាប ធ្វើកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងបានទៀងទាត់ និងមានទីផ្សារបោះដុំច្បាស់លាស់។



ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

- ១/ កសិករចិញ្ចឹមទាកប៉ានៅឃុំត្រពាំងចាន់ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
- ២/ ឯកសារការចិញ្ចឹមទាកប៉ាជាលក្ខណៈគ្រួសារ (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)
- ៣/Muscovy Duck Male Vs Female: Physical Differences & Sexing (earthlife.net)
- ៤/Pekin Duck vs Muscovy Duck - What is the Difference? - LearnPoultry
- ៥/Common Parasites in Ducks - The Happy Chicken Coop