



ធនាគារកសិកម្មនិងជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ដំណាំចេកអំបូងលេឡីង



គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ធនាគារកសិកម្មនិងជនបទ និងកសិកម្ម

ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥



023 220 811
023 220 810
070 463 219

168, Street 7, Prek Leap Village, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Changva, Phnom Penh

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម	១
២-ការអនុវត្តការដាំដុះ	១
ក-ការរៀបចំដី ការដីករណ្តៅ និងការដាក់ដីទ្រាប់បាត.....	១
ខ-ការជ្រើសរើសពូជ.....	១
គ-ពេលវេលាដាំដុះ.....	៣
ឃ-ការដាំដុះ.....	៣
៣-ការថែទាំ	៤
ក-ការស្រោចស្រព.....	៤
ខ-ការបង្ការទឹកចេញ និងការគ្រប់គ្រងជីជាតិដី.....	៤
គ-ការដាក់ជីគីមី និងជីកំប៉ុស.....	៥
ឃ-ការសម្អាតស្មៅ.....	៥
ង-ការពូនគល់.....	៦
ច-ការទល់ដើមចេក និងកាត់ត្រយូង.....	៦
ឆ-ការទ្រាប់ស្មៅចន្លោះស្លឹកចេក និងច្រកស្នងចេក.....	៦
ជ-ការរំលស់កូន និងកាត់ស្លឹកចេក.....	៧
៤-កត្តាសត្វល្អិត និងជំងឺ	៧
ក-ប្រភេទសត្វល្អិត.....	៧
ខ-ប្រភេទជំងឺ.....	៩
៥-ការប្រមូលផល	១០
៦-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំចេកអំបូងលឿងលើផ្លែដ៏ឯហិតតា	១១
ក. តារាងវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះចេកអំបូងលឿងក្រុមហ៊ុនមួយ នៅខេត្តកំពត.....	១១
ខ. តារាងចំណាយ និងចំណូលដុលសង្ខេបលើការដាំដំណាំចេកអំបូងលឿង១ហិតតា.....	១២
គ. តារាងចំណាយ និងចំណូលសង្ខេបក្រោយរំលស់.....	១២
៧-បញ្ហាប្រឈម	១៣
៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	១៤
ប្រភពសិក្សាស្រាវជ្រាវ	១៥

ដំណាំចេកអំបូងលឿង

១-សេចក្តីផ្តើម

ចេកអំបូងលឿងជាប្រភេទដំណាំដែលឆាប់ផ្តល់ផល មានទិន្នផលខ្ពស់ ងាយស្រួលថែទាំ និងទទួលបានផលចំណេញបង្អស់ដែលត្រឹមអាយុ៨ខែ អាចប្រមូលផលបាន។ ចេកអំបូងលឿងមានដើមធំ រឹងមាំ ផ្លែវែង ទម្ងន់ធ្ងន់ សំបកក្រាស់ សម្បុរប្រែជាពណ៌លឿងនៅពេលផ្លែទុំ ហើយអាចផ្តល់ទំនាក់ទំនងជីកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយ។ ចេកអំបូងលឿងអាចមានផ្លែជាមធ្យមពី ៧-១០ស្លឹកក្នុង១ស្ពង់ និងមានផ្លែចំនួនពី១៦-២២ផ្លែក្នុង១ស្លឹក ទម្ងន់ផ្លែចេកជាមធ្យមពី២២-៣០គ.កក្នុង១ស្ពង់ (ទម្ងន់ផ្លែសុទ្ធ) ។

បច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារចេកអំបូងលឿងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកព្រោះមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអ្នកបរិភោគដោយសារតែចេកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ក្លិនឈ្ងុយ និងមានតម្លៃសមរម្យ។ ពូជចេកអំបូងលឿងទើបតែត្រូវបាននាំមកដាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស ជាពិសេសប្រទេសចិន។ ហេតុនេះហើយបានជាដំណាំនេះត្រូវបានប្រជាកសិករកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ដាំដុះកាន់តែច្រើនឡើងៗ។

២-ការអនុវត្តការដាំដុះ

ក. ការរៀបចំដី ដីករណ្តៅ និងដាក់ដីទ្រាប់បាត៖ ត្រូវភ្ជួរដីឱ្យម៉ដ្ឋល្អយ៉ាងតិច២ដង ដើម្បីឱ្យដីធូរល្អ ដោយលើកទី១ដើម្បីកម្ទាត់ស្មៅ លុបកំទេចកំទីរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៅក្នុងដី និងហាលដីឱ្យបានស្ងួតដើម្បីកាត់បន្ថយសត្វល្អិតចង្រៃ ជំងឺ សម្លាប់ស្មៅ និងលើកទី២ភ្ជួរដើម្បីឱ្យដីផុសល្អ។ ក្រោយការរៀបចំដីរួចរាល់ត្រូវបោះបង្គោលឱ្យរត់ត្រង់គ្នាជាជួរសម្រាប់កាប់រណ្តៅដាំដែលមានទំហំ ០.៥ ម៉ែត្របួនជ្រុង ជម្រៅ ០.៥ ម៉ែត្រ។ មុនការដាំត្រូវរៀបចំរណ្តៅដោយដាក់ដីទ្រាប់បាតរួមមាន៖ ជីកំប៉ុស ៥គីឡូក្រាមក្នុង១រណ្តៅ ជីគីមី ១០០ក្រាមក្នុង១រណ្តៅ ហើយទុករយៈពេលពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ មុនពេលដាក់ដាំ។

ខ. ការជ្រើសរើសពូជ៖ កសិករអាចជ្រើសរើសពូជចេកអំបូងលឿង Cavendish ដែលជាកូនចេកបានមកពីធ្វើជាលិការប្បកម្ម (Tissue culture) និងកូនចេកដុះពីគល់ដើមមេដែលមានសុខភាពល្អ និងកូនចេកបណ្តុះចេញពីក្តិលចេក (គល់ចេក)។ Cavendish ជាពូជចេកឆាប់ផ្តល់ផលត្រឹមអាយុ៨ខែ ដោយចាប់ផ្តើមចេញត្រយូងនៅអាយុ៥ខែបន្ទាប់ពីដាំ។ កសិករអាចជ្រើសរើសកូនចេកសម្រាប់ដាំបានបីយ៉ាង៖

- **កូនចេកបណ្តុះចេញពីជាលិកា៖** កូនចេកដែលបណ្តុះដោយជាលិការប្បកម្ម (Tissue culture) គឺជាការយកជាលិកាគល់ដើមមេមានលក្ខណៈល្អមកបណ្តុះក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ដោយមានប្រើសារធាតុគីមីមួយចំនួន។ បន្ទាប់ដុះពេញលក្ខណៈ កូនចេកត្រូវបានថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្សំក្នុងថង់នៅថ្នាល។ កូនចេកដែលអាចយកទៅដាំក្នុងចម្ការបានត្រូវមានកម្ពស់ចន្លោះពី ០.៤-០.៧ម៉ែត្រ។ កូនចេកបណ្តុះ

ដោយជាលិការប្បកម្ម (Tissue culture) មានលក្ខណៈល្អជាងកូនចេកដែលដុះពីគល់ដើមមេ ព្រោះថា កូនចេកមានទំហំដើមប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ងាយស្រួលថែទាំ ប្រមូលផលដំណាលគ្នា និងមានសុវត្ថិភាពពី ការចម្លងជំងឺនិងសត្វល្អិតផ្សេងៗ។



កូនចេកដែលបណ្តុះដោយជាលិការប្បកម្ម

- ការជ្រើសរើសកូនចេកចេញពីដើមមេ៖ ក្នុងករណីដែល កសិករមិនអាចរកកូនចេកផលិតដោយជាលិការប្បកម្មបាន កសិករអាចជ្រើសរើសកូនចេកចេញពីដើមមេដោយផ្អែកលើលក្ខណៈ ដើមមេថ្លោសមាំ ទំហំធំផ្លែ ស្ករមាំ វែង គ្មានផ្ទុកជំងឺ និងសត្វ ល្អិត។ កូនចេកដែលអាចដាំបានត្រូវមានកម្ពស់ចន្លោះពី ០.៥- ១ម៉ែត្រ តែបើមានកម្ពស់លើសនេះ កសិករត្រូវកាត់ស្លឹក និង ធាងធំៗចោល។ កសិករគួរយកកូនចេកដែលមានបណ្តាល ស្លឹកមូលលូតឡើងមិនទាន់រលាយទៅដាំ ព្រោះដើមចេក ឆាប់ចេញបូសថ្មី។ កសិករត្រូវប្រើចបដឹកដែលមុខមុតល្អនៅ ពេលដឹកគាស់កូនចេកចេញពីដើមមេដើម្បីការពារកុំឱ្យខូច។ ត្រូវកាត់បូស ស្រទបចេកចាស់ៗ និងស្លឹកទុំចេញពីដើម ចំណែកស្លឹកផ្សេងៗទៀតត្រូវកាត់ត្រឹមពាក់កណ្តាលធាង ដើម្បីការពារកុំឱ្យសត្វល្អិតផ្សេងៗតោងភ្ជាប់មកជាមួយ។



កូនចេកដែលដុះចេញពីដើមមេ

- កូនចេកដែលបណ្តុះចេញពីក្តិលចេក (គល់ចេក)៖ កសិករអាចគាស់ក្តិលចេកដែលមានអាយុពី ៧ទៅ៨ខែ ដោយកាត់សំអាតបូស និងពិនិត្យមើលភ្នែកកូនចេកជុំវិញក្តិលហើយពុះពី ៤ទៅ១០ ចំណិត អាស្រ័យនឹងទំហំគល់ចេក។ បន្ទាប់ពីពុះកាត់ជាដុំដោយមានជាប់ភ្នែកកូនចេកត្រូវយកទៅហាលថ្ងៃ ប្រមាណ២០ទៅ៣០នាទី បន្ទាប់មកត្រាំជាមួយទឹកកំបោរការពារជំងឺផ្សិត (លាយកំបោរ១០០ក្រាម

ជាមួយទឹក២០លីត្រ) ឬប្រឡាក់នឹងផេះចង្ក្រានត្រង់មុខកាត់ មុនយកទៅបណ្តុះក្នុងថ្នាល។ នៅពេល កូនចេកដុះបាន២០សង់ទីម៉ែត្រ ត្រូវកាត់ដាក់ចងបំប៉នរហូតមានកម្ពស់ ០.៤ ទៅ ០.៧ម៉ែត្រ មុននឹងយក ទៅដាំក្នុងចម្ការ។



វិធីបណ្តុះកូនចេកចេញពីក្តិលចេក (គល់ចេក)

គ.ពេលវេលាដាំដុះ៖ កសិករគួរដាំដំណាំចេកនៅដើមរដូវភ្លៀងគឺចាប់ពីខែឧសភា-សីហា ព្រោះកូន ចេកត្រូវការសំណើមដ៏ខ្ពស់ដើម្បីលូតលាស់បានល្អ និងកាត់បន្ថយអត្រាងាប់ដើមបន្ទាប់ពីដាំ។

ឃ.ការដាំដុះ៖ កសិករអាចដាំដើមចេកចន្លោះដើម ២ម៉ែត្រ x ២ម៉ែត្រ ឬ ២ម៉ែត្រ x ៣ម៉ែត្រ ឬ ៣ម៉ែត្រ x ៣ម៉ែត្រ ឬ ៣ម៉ែត្រ x ៤ម៉ែត្រ ទៅតាមស្ថានភាពដីចម្ការ ដោយត្រូវដាក់ដាំកូនចេកក្នុងរណ្តៅឱ្យលិច គល់ទៅក្នុងដី ជាន់ដីជុំវិញដើមឱ្យណែនដើម្បីទប់លំនឹង កុំឱ្យដើមឆាប់ឡើងគល់ ឬបាក់ដោយសារខ្យល់ និង ងាយចេញឫសថ្មី។ កសិករគួរយកស្លឹកឈើស្ងួត ឬចំបើងគ្របលើដីជុំវិញគល់សម្រាប់រក្សាសំណើម ជួយ បង្កើនដីជាតិដី និងត្រជាក់ដល់គល់កូនចេកទើបដាំថ្មី។ ដើម្បីពន្លឿនការចេញឫសថ្មីផងដែរ។



ការដាក់ដាំកូនចេក

៣. ការថែទាំ

ក. ការស្រោចស្រព៖ ដំណាំចេកអំបូងលឿងត្រូវការទឹកស្រោចស្រពត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសនៅរដូវប្រាំង ក្នុងករណីដែលគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ ឬដីស្ងួតខ្លាំង ដោយដើមចេកអាយុពី១ខែដល់៣ខែត្រូវស្រោចទឹកពី ៥លីត្រ ទៅ ១០លីត្រ ក្នុង១ថ្ងៃក្នុង១ដើម។ ដើមចេកអាយុ៤ខែឡើងទៅត្រូវស្រោចទឹកពី ១៥លីត្រ ទៅ ២០លីត្រក្នុង១ថ្ងៃក្នុង១ដើម។ កសិករត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹកនៅជិតពេលប្រមូលផលដើម្បីបង្កើនរសជាតិផ្លែមដល់ផ្នែក។ កូនចេកដែលទើបដាំហើយ ត្រូវស្រោចទឹកភ្លាមដើម្បីឱ្យដើមឆាប់ចាប់បូសថ្មី។ អាចប្រើប្រព័ន្ធទឹកដណាក់ (Dripper), សាច (Sprinkler) ឬ ចង្កូរប្រឡាយបង្ហូរទឹក។



ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនៅចម្ការចេកប្រភេទ ដណាក់ (Dripper) ចង្កូរប្រឡាយ (Canal) និងសាច

ខ- ការបង្ហូរទឹកចេញ និងការគ្រប់គ្រងជីជាតិដី៖ ដំណាំចេកមិនអាចដុះលូតលាស់បានល្អនៅលើដីដែលជ័រទឹក ឬមានទឹកជោតជាំពេកទេ ដូច្នេះក្នុងការដាំដុះ កសិករត្រូវរៀបដីឱ្យបានស្មើល្អទៅតាមស្ថានភាពដីចម្ការ កុំឱ្យមានដក់ទឹកយូរពេលភ្លៀងខ្លាំង និងដីកប្រឡាយបង្ហូរទឹក ទទឹង១ម៉ែត្រ ជម្រៅ១ម៉ែត្រ គម្លាតពី១ទៅ ១ ចម្ងាយ៨ម៉ែត្រនៅក្នុងចម្ការចេកដើម្បីស្រស់ទឹកបានល្អ។ ចំពោះការគ្រប់គ្រងជីជាតិដី ត្រូវដាក់កំប៉ុស១ដងទៅ ២ដងក្នុង១ដើមក្នុង១ឆ្នាំ ហើយត្រូវគ្របគល់ជាមួយចំបើងស្ងួត ឬកំទេចកំទីស្មៅស្ងួតគម្លាត៥០សង់ទីម៉ែត្រចេញពីគល់ កាត់ស្លឹកដាក់តាមបណ្តោយជួរគម្លាត១ម៉ែត្រពីគល់ ដើម្បីរក្សាសំណើម បង្កើនជីជាតិដី កាត់បន្ថយការហូរច្រោះដីដែលនាំឱ្យដីបាត់បង់សារធាតុសរីរាង្គ និងជីជាតិដីដែលហូរទៅតាមទឹក។



ប្រព័ន្ធចង្កូរទឹកចេញពីចម្ការចេក

គ. ការដាក់ជីគីមី និងកំប៉ុស្តៈ ដំណាំចេកអំបូងលឿងត្រូវការបន្ថែមជីគីមី NPK និងជីកំប៉ុសបំប៉នសម្រាប់ការលូតលាស់ល្អ និងឆាប់ចេញត្រយូង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រិតនៃការប្រើជីក្នុង១ដើមក្នុង១វគ្គៈ


- ដាក់ជីទ្រាប់បាត ៖ ជីកំប៉ុស្តៈ៥គ.ក+ជី១៥-១៥-១៥ ១០០ក្រាម
- ចេកអាយុ១ខែ៖ ជី ១៥-១៥-១៥ ១០០ក្រាម+ជីអ៊ុយរ៉េ៥០ក្រាម+DAP ៥០ក្រាម
- ចេកអាយុ៣ខែ៖ ជី១៥-១៥-១៥ ២០០ក្រាម+កំប៉ុស ៥គ.ក+កាលីប្លូតាស្យូម១០០ក្រាម
- ចេកអាយុ៥ខែ៖ ជី១៥-១៥-១៥ ២០០ក្រាម+ ជីអ៊ុយរ៉េ៥០ក្រាម +DAP ៥០ក្រាម+ បាចជីប្លូតាស្យូម (Potassium Sulphate)១០០ក្រាម
- ចេកអាយុ៦ខែ៖ ដាក់ជី ១៥-១៥-១៥ ២០០ក្រាម
- ចេកអាយុ៧ខែ កាត់ត្រយូង បាចជីប្លូតាស្យូម (Potassium Sulphate) ១០០ក្រាម
- ចម្ងាយដាក់ជី ០.៧ម៉ែត្រ ជុំវិញគល់ចេក(ឬបាចជុំវិញគល់តែម្តងនៅរដូវវស្សា)
- ត្រូវកប់ជីទៅក្នុងដី ដើម្បីរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមកុំឱ្យបាត់បង់ (អាចបាចជុំវិញបានករណីដីមានសំណើមតែមិនត្រូវបាចនៅពេលមេឃកំពុងភ្លៀងទេ)។

ឃ- ការសម្អាតស្មៅ៖ ក្រោយការដាំចេករយៈពេល១ខែ កូនចេកចាប់ផ្តើមចេញស្លឹកបណ្តាលពី១-២សន្លឹក កសិករត្រូវធ្វើការជម្រះស្មៅចេញ ដើម្បីកុំឱ្យប្រជែងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមជាមួយកូនចេកដែលកំពុងលូតលាស់។ ក្នុង១វគ្គអាចធ្វើ២ ទៅ ៣ដង អាស្រ័យលើកម្រិតស្មៅដែលដុះក្នុងចម្ការ។ កសិករអាចមានជម្រើសប្រើប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណាំចេក ដោយពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញជាមុនពេលទិញថ្នាំទៅប្រើប្រាស់។ កសិករត្រូវឆ្លងថ្លែងរវាងការជម្រះស្មៅដោយដៃ និងការប្រើថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ។ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅអាចជួយឱ្យចំណេញពេលវេលា កម្លាំងពលកម្ម មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយអាចជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មប្រសិនបើប្រើប្រាស់តាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ។ កសិករអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្មៅដូចជា ការគ្របបំបើងស្នូត ស្មៅស្នូត និងការប្រើដំណាំគម្របដីដែលសមស្របជាមួយដំណាំចេកដូចជា៖ Arachis Pintoi ឬសណ្តែកខៀវដោយដាំឱ្យញឹកជួយបង្កើនជីជាតិដល់ដីផង និងទប់ស្កាត់ស្មៅចង្រៃផង។



ការសម្អាតស្មៅដោយដៃ ដាំដំណាំចន្លោះជួរ និងដំណាំគម្របដី

ង- ការពូនគល់ចេក៖ ការពូនគល់ចេកមានសារសំខាន់ណាស់ព្រោះជួយលុបបូសចេកដែលអណ្តែតឡើង ជួយបង្កើនការចេញបូសថ្មី ជួយដល់ការទប់លំនឹងដើមចេកមិនឱ្យដួលរលំពេលខ្យល់បក់បោកខ្លាំង ធ្វើឱ្យកូនចេកដែលដុះចេញពីដើមមេមានសភាពរឹងមាំល្អ និងជំរុញការលូតលាស់បន្ថែមទៀត ដែលជាកត្តានៃការកើនទិន្នផលដ៏ណាំចេក។



ការពូនដីជុំវិញគល់ចេក

ច- ការទល់ដើម និងការកាត់ត្រយូងចេក ៖ នៅពេលដែលដើមចេកមានអាយុ៥ខែ ចេកនឹងចាប់ផ្តើមចេញត្រយូង កសិករត្រូវទល់ដើមចេកដោយចងបូស្សី- ឈើជំពាមទប់ដើម្បីការពារកុំឱ្យបាក់ដើម និងស្ទង់ចេក (ដូចរូបខាងក្រោម) ឬខ្សែចងប្រទាក់គ្នានៅខាងចុងដើមជាប់នឹងគល់ស្ទង់ចេកពីដើមចេកមួយទៅមួយទៀត។ ការកាត់ត្រយូងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចេកចេញផ្ទៃអស់ដោយទុកគម្លាត១៥សង់ទីម៉ែត្រពីស្លឹកចុងក្រោយនៃស្ទង់។



ការចងបូស្សីទប់ដើមការពារលើគល់ បាក់ដើម និងបាក់ស្ទង់ចេក

ឆ- ការទ្រាប់បន្ទះស្មៅចន្លោះស្លឹក ការច្រកផ្លែ (ទាំងស្ទង់) ៖ ការទ្រាប់បន្ទះស្មៅស្ទើងចន្លោះស្លឹកជួយការពារកុំឱ្យផ្លែចេកប្រឡាក់ជ័រ និងការប៉ះកកិតផ្លែ។ ការច្រកស្ទង់ចេកដោយប្រើប្លាស្ទិកពណ៌ខៀវមានសារៈសំខាន់ដើម្បីការពារផ្លែពីសត្វល្អិតចង្រៃ និងអាចរក្សាពណ៌សម្បុរផ្លែបានល្អ។



ការសិកបន្ទះស្មៅស្ទើងចន្លោះស្លឹកចេក និងច្រកស្ទង់ចេកដោយចងប្លាស្ទិកខៀវ

ជ. ការរំលស់កូន និងកាត់ស្លឹកចេក៖ ចំពោះការរំលស់កូនចេក កសិករត្រូវទុកកូនតែ១ដើមក្នុង ១គុម្ពបានហើយដើម្បីឱ្យដើមមេមានផ្លែធំល្អត្រូវតាមស្តង់ដា ចំណែកកូនចេកផ្សេងៗទៀត កសិករអាច គាស់ផ្សំលក់កូន ឬកាត់ចោលតែម្តងក៏បាន។ ចំពោះស្លឹកចេកដែលចាស់ៗ ត្រូវកាត់ទម្លាក់ហើយដាក់តាម គល់ចេកគម្លាត៥០សងទីម៉ែត្រពីគល់។




ការរំលស់កូនចេកដោយរក្សាទុកតែកូន១ដើម/គុម្ព និងកាត់ស្លឹកចាស់ដាក់ចន្លោះជួរ

៤-កត្តាសត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺ

ក. ប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃ

➢ ខ្វេតស៊ីគល់ចេក ឬខ្វេតចេក៖ ខ្វេតប្រភេទនេះមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Cosmopolite sordidus-Germ ដោយសារវាបានបញ្ចេញពងចូលទៅក្នុងក្លៀងចេក និងក្តិលចេក ហើយបន្ទាប់មកទៀត ពងក៏ញាស់ជាដង្កូវខ្វេតស៊ីគៀង និងក្តិលនោះរហូតដល់រលួយ ហើយចេកចាប់ផ្តើមងាប់ស្លឹក និងដើម។

វិធានការ៖ អាចប្រើថ្នាំ Chlorpyrifos និង Cypermethrin ៣០cc+១៦លីត្រទឹក បាញ់តាមគល់ចេក។



វដ្តជីវិត និងការបំផ្លាញរបស់ខ្វេត ឬខ្វេតលើដំណាំចេក

➢ **ដង្កូវមូស្លីកចេក**÷ កើតចេញពីមេអំបៅដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Erionota Thrax L.* ពេលវេលាបំផ្លាញដំណាំចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែឧសភា ដោយខាំហែកស៊ីស្លឹកចេក ហើយមូស្លីក។
វិធានការ÷ អាចបាញ់ថ្នាំ Fipronil ២0cc+១៦លីត្រទឹក បាញ់លើកន្លែងបំផ្លាញ។



វដ្តជីវិត និងការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវមូស្លីកលើដំណាំចេក

➢ **រុយចោះផ្លែ**÷ រុយប្រភេទនេះ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា *Dacus Dorsalis Handel*។ រុយទាំងនេះចោះលើផ្លែចេកដែលជិតទុំហើយពងដាក់កន្លែងដែលចោះនោះ ដោយពងម្តងៗបានពី ៥ ទៅ ១០ពង ហើយមួយថ្ងៃអាចពងបានពី ២០ ទៅ៥០គ្រាប់។ **វិធានការ**÷ អាចប្រើអន្ទាក់ហ្វូរ៉ូម៉ូន និងថ្នាំ Imidacloprid ២0cc+១៦លីត្រទឹកបាញ់ការពារផ្លែពេលចាស់ ព្រោះសត្វល្អិតបំផ្លាញតែផ្លែចាស់ជិតទុំ។

	រុយចោះផ្លែមាន៤ប្រភេទ (a) <i>Bactrocera zonata</i> (b) <i>Bactrocera dorsalis</i> (c) <i>Bactrocera correcta</i> (d) <i>Bactrocera cucurbitae</i>
--	---

ប្រភេទរុយចោះផ្លែ

➢ **Aphids(ចៃហ្គង)**÷ ពពួក **Aphids** វាយប្រហាររុក្ខជាតិត្រូវពិចជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែដំណាំចេកគឺងាយរងគ្រោះបំផុត។ សត្វល្អិតនេះមានប្រវែងជាង ២មីលីម៉ែត្រ និងផ្លាស់ទីដោយតោងជាប់នឹងដើមចេក ហើយចិញ្ចឹមខ្លួនដោយជញ្ជក់រុក្ខសពីជាលិការបស់ចេក។ Aphids អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ដើមចេក ហើយជាលិកាដែលបានខូចគឺងាយនឹងរងការវាយប្រហារដោយជំងឺផ្សេងៗ។

ដើមចេកដែលត្រូវបានសត្វល្អិតទាំងនេះវាយប្រហារជាធម្មតាមានស្លឹករួញ។ **វិធានការ៖** កាត់ស្លឹកដែល
រងការបំផ្លាញដុតចោល ឬប្រើថ្នាំ Thiamethoxam ២៥cc+១៦លីត្រទឹកបាញ់លើកន្លែងបំផ្លាញ។




ការបំផ្លាញរបស់ Aphids (ចៃហ្វូង) លើដំណាំចេក

ខ. ប្រភេទជំងឺ


ពពួកជំងឺលើដំណាំចេកភាគច្រើនបង្កឡើងដោយផ្សិត និងបាក់តេរី ដោយភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺទាំង
នេះបណ្តាលមកពីសត្វល្អិត អាកាសធាតុ តាមរយៈខ្យល់ ទឹកភ្លៀង ឬរូបិកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ពីតំបន់
ខ្ពស់ទៅទាប។ លើសពីនេះ សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យភ្នាក់ងារបង្ករោគងាយនឹងបំផ្លាញ
ដល់ដំណាំចេក ជាពិសេសជំងឺផ្សិត។

➢ **ជំងឺស្រពោនលឿងស្លឹក៖** បង្កឡើងដោយផ្សិត *Fusarium Oxysporum f.sp.cubense* គឺ
ជាជំងឺដែលបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផលិតកម្មដំណាំចេកទូទាំងពិភពលោក។ ជំងឺនេះមានឈ្មោះថា
Tropical Race 4(Foc TRA4) ហើយត្រូវបានរកឃើញលើប្រភេទចេកអំបូងលឿងដែលជាប្រភេទចេក
ពេញនិយមដាំ និងដាក់លក់លើទីផ្សារច្រើនជាងគេ។ **វិធានការ៖** ជំងឺនេះអាចបង្ការបានតាមរយៈវិធីសាស្ត្រ
ជីវសុវត្ថិភាព (អនាម័យលើការចេញ-ចូលនៃបុគ្គលិកកម្មករ សម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅចម្ការ មធ្យោបាយដឹក
ជញ្ជូន និងទីកស្រោចស្រពដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់)។



រោគសញ្ញានៃជំងឺ Foc TRA4 លើ

➢ **ជំងឺអុចស្លឹក**៖ បង្កឡើងដោយមេរោគផ្សិត Cercospora Musae មានរោគសញ្ញាដូចជា៖
 ១)- ស្នាមគំនូសពណ៌ត្នោត ឬត្នោតក្រហមខ្លីស្របនឹងសរសៃស្លឹក ស្នាមអុចលឿង-ប្រផេះ-ត្នោតលើស្លឹក
 ២)- ទំហំស្លឹក ផ្ទៃរួមតូច និងអាចប្តូរជាពណ៌លឿង។ **វិធានការ**៖ កាត់ស្លឹកយកទៅដុតបំផ្លាញចោល និង
 ត្រូវបាញ់ថ្នាំគីមី (Copper Oxychloride ឬ Mancozeb, Benomyl) ផ្សំជាមួយទឹកសាប៊ូដោយបាញ់១ខែ
 ២ទៅ៣ដង។



រោគសញ្ញាជំងឺអុចស្លឹកលើដំណាំចេក

៥. ការប្រមូលផល

បន្ទាប់ពីការលូតលាស់រយៈពេលពេញ៤ខែ នៅខែទី៥ចេកអំបូងលឿងចាប់ផ្តើមចេញត្រយូង។ នៅដើមខែទី៦ ដល់ពេលដែលត្រូវកាត់ត្រយូងចេញ ហើយចងខ្សែអំបោះចំណាំទុកព្រោះនៅពេល២ខែ បន្ទាប់គឺនៅចុងខែទី៨ ឬដើមខែទី៩ ជាពេលត្រូវប្រមូលផល។ ទិន្នផលជាមធ្យមក្នុង១ស្ពង់មានចាប់ពី៧ ទៅ១០ស្លឹក ក្នុង១ស្លឹកពី ១៦ ទៅ១៨ផ្លែ និងទម្ងន់ជាមធ្យមពី២២គ.ក ទៅ៣០គ.កក្នុង១ស្ពង់។

កសិករអាចពិនិត្យទៅលើទំហំផ្លែ ជ្រុងផ្លែ និងលក្ខណៈល្អរបស់ដើម បើកាលណាផ្លែចេកនៅមាន ជ្រុងច្រើន បានន័យថាភាពចាស់របស់ផ្លែអាចពន្យារពេលបានយូរ តែបើពិនិត្យឃើញផ្លែឡើងមូលហើយ ផ្លែមិនអាចទុកយូរបានទៀតទេ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ដើម្បីសម្គាល់ថាផ្លែចេកចាស់ កសិករអាចកាត់ផ្លែចេក ដើម្បីមើលបើឃើញឡើងពណ៌លឿងហើយ គឺផ្លែចេកចាស់ល្មមប្រមូលផលបាន។

របៀបប្រមូលផលត្រូវប្រើដៃម្ខាងចាប់ផ្នែកចុងនៃស្ពង់ចេកដោយដាក់ស្ពង់លើស្នា ហើយចាំបាច់ ត្រូវការមនុស្ស២នាក់ ដោយម្នាក់ទ្រនិងកាន់ស្ពង់ និងម្នាក់ទៀតជាអ្នកកាត់ស្ពង់ចេក។ សម្រាប់ការប្រមូល ផលជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មចេកអំបូងលឿងនេះ គឺគេប្រឡេះស្លឹកចេកចេញពីស្ពង់ រួចដាក់ចូលទៅក្នុង អាងទឹក ដើម្បីលាងសម្អាតធូលីដី ឬបន្ទាប់សារធាតុទង់ដែង និងបណ្តេញពពួកសត្វល្អិតចង្រៃដែលជាប់ ជាមួយនឹងផ្លែចេក។ ក្រោយការលាងសម្អាតស្អាតហើយ ត្រូវស្រង់ស្លឹកចេកចេញពីអាងដាក់សំដីលរហូត ដល់ស្ងួត ទើបធ្វើការវេចខ្ចប់ និងដាក់បញ្ចូលក្នុងទូរត្រជាក់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារ។



ការប្រមូលផលផ្លែចេក លាងសម្អាត និងវេចខ្ចប់សម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស

៦-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំចេកអំបូងលឿង

ក. ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះចេកអំបូងលឿងនៅចម្ការដំណាំចេកនៅខេត្តកំពត
ឯកតាវិភាគ÷ផ្ទៃដី១ហិកតា ដាំចេកចំនួន ២,៥០០ដើម អត្រាបាត់បង់៥% តម្លៃលក់ ៣,០០០\$ /គ.ក្រ

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)	ចំនួនសា រិលស (រៀល)	ការចំណាយ ក្រោយ រិលស (រៀល)
I-ចំណាយលើការចាប់ផ្តើម និងការថែទាំវគ្គទី១ (៨ខែដំបូង)				91,435,000		76,475,000
ថ្លៃភ្នាក់ងារដី	សារ	2	150,000	300,000		300,000
ពូជចេក (កូនចេក)	ដើម	2,500	10,000	25,000,000		25,000,000
ឈ្នួលរៀបច្រោះ- ដាំ	ដើម	2,500	500	1,250,000		1,250,000
ឈ្នួលកាប់រណ្តៅ ដាក់ដី និងដាំ	រណ្តៅ	2,500	2,000	5,000,000		5,000,000
គីមីទ្រាប់បាត ១៥៥(NPK) ០.១គ.ក/រណ្តៅ	គ.ក	250	3,000	750,000		750,000
កំប៉ុសទ្រាប់បាត៥គ.ក/រណ្តៅ	គ.ក	12,500	700	8,750,000		8,750,000
ចំណាយលើការជួសជុល	ពូជ	ដើម	125	10,000	1,250,000	1,250,000
កូនចេកខូចបាត់៥%	ឈ្នួលដាំ	ដើម	125	1,000	125,000	125,000

ប្រព័ន្ធស្រោច១ហ.ត និងម៉ាស៊ីន	ឈុត	1	18,600,000	18,600,000	5	3,720,000
ម៉ូទ័របាញ់ថ្នាំប្រើខ្សែស្ពាយ (២វគ្គ)	គ្រឿង	1	160,000	160,000	2	80,000
កម្លាំងពលកម្ម	នាក់ ខែ	8	1,000,000	8,000,000		8,000,000
ថ្លៃអគ្គិសនី និងប្រេងឥន្ធនៈ	ខែ	6	135,000	810,000		810,000
ថ្លៃបាញ់ស្មៅតាមគល់ (៣ដង/វគ្គ)	ដង	3	80,000	240,000		240,000
បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងជំងឺ	ដង	2	100,000	200,000		200,000
ជីគីមីបំប៉ន (NPK)=១.៣គ.ក/ដើម	គ.ក	3,250	3,000	9,750,000		9,750,000
កំប៉ុសបំប៉ន (៥គ.ក)	គ.ក	12,500	700	8,750,000		8,750,000
ថ្លៃបន្ទះស្មៅទ្រាប់ចន្លោះស្លឹកចេក	ស្ពង	2,500	500	1,250,000		1,250,000
ថ្លៃថង់ច្រកចេក(ទាំងស្ពង)	ស្ពង	2,500	500	1,250,000		1,250,000
ចំណូលពីការលក់ផ្លែចេកវគ្គទី១ (៣០គ.ក/ស្ពង/វគ្គ)-៥%នៃ២៥០០ដើម នៅសល់ ២៣៧៥ដើមឬស្ពង	គ.ក	71,250	3,000	213,750,000		213,750,000
លទ្ធផល (ចំណេញ) វគ្គទី១				122,315,000		137,275,000
II-ចំណាយលើការថែទាំនៅវគ្គទី២				41,810,000		45,610,000
ប្រព័ន្ធស្រោច១ហ.ត និងម៉ាស៊ីន	ឈុត	1	18,600,000		5	3,720,000
ម៉ូទ័របាញ់ថ្នាំប្រើខ្សែស្ពាយ (២វគ្គ)	គ្រឿង	1	160,000		2	80,000
កម្លាំងពលកម្ម	នាក់ ខែ	8	1,000,000	8,000,000		8,000,000
ថ្លៃអគ្គិសនី និងប្រេងឥន្ធនៈ	ខែ	6	560,000	3,360,000		3,360,000
ថ្លៃជីវះស្រោចតាមគល់ (២ដង/វគ្គ)	ដង	2	150,000	300,000		300,000
បាញ់សម្លាប់សត្វល្អិត និងជំងឺ	ដង	2	200,000	400,000		400,000
ដាក់ជីគីមី (១.៣គ.ក/ដើម/វគ្គ)	គ.ក	3,250	3,000	9,750,000		9,750,000
ជីកំប៉ុស (១០គ.ក/ដើម/វគ្គ)	គ.ក	25,000	700	17,500,000		17,500,000
ថ្លៃបន្ទះស្មៅទ្រាប់ចន្លោះស្លឹកចេក	ស្ពង	2,500	500	1,250,000		1,250,000
ថ្លៃថង់ច្រកចេក(ទាំងស្ពង)	ស្ពង	2,500	500	1,250,000		1,250,000
ចំណូលពីការលក់ផ្លែចេកវគ្គទី២ (៣០គ.ក/ស្ពង/វគ្គ)-៥%នៃ២៥០០ដើម នៅសល់ ២៣៧៥ដើមឬស្ពង	គ.ក	71,250	3,000	213,750,000		213,750,000
លទ្ធផល (ចំណេញ) វគ្គទី២				171,940,000		168,140,000

ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចខាងលើមិនបានរាប់បញ្ចូលនូវការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូន ចំណាយលើឃ្លាំង ត្រជាក់ស្តុកផលិតផលចេកមុនពេលដឹកចេញលក់ទៅទីផ្សារ និងសម្ភារៈវេចខ្ចប់ឡើយ។

**ខ. តារាងចំណូល និងចំណាយដុលដោយមិនមានការរំលោះលើការដាំដំណាំចេកអំបូងលឿងលើផ្ទៃ
ដី១ហិកតា (ក្នុងករណីចេកលក់ក្នុងតម្លៃ ៣,០០៛/គ.ក)**

វគ្គ	ទិន្នផល ក្នុង១ហិកតា			តម្លៃ (រៀល/គក្រ)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណាយសរុប (រៀល)	លទ្ធផលសុទ្ធ (រៀល)
	ចំនួនដើម	គ.ក/ដើម	ទម្ងន់សរុប(គ.ក)				
វគ្គទី១	2,375	30	71,250	3,000	213,750,000	91,435,000	133,565,000
វគ្គទី២	2,375	30	71,250	3,000	213,750,000	41,810,000	171,940,000

គ. តារាងចំណាយនិងចំណូលសង្ខេបក្រោយរំលស់លើការដាំដំណាំចេកអំបូងលឿង

វគ្គ	ទិន្នផល ក្នុង១ហិកតា			តម្លៃ (រៀល/គក្រ)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណាយ រំលស់ (រៀល)	លទ្ធផល ក្រោយរំលស់ (រៀល)
	ចំនួនដើម	គ.ក/ដើម	ទម្ងន់សរុប(គ.ក)				
វគ្គទី១	2,375	30	71,250	3,000	213,750,000	76,475,000	137,275,000
វគ្គទី២	2,375	30	71,250	3,000	213,750,000	45,610,000	168,140,000

* តាមតារាងខាងលើ យើងសង្កេតឃើញថាការដាំដុះដំណាំចេកអំបូងលឿងចាប់ផ្តើមផ្តល់ផល
ចំណេញចាប់ពីវគ្គទី១ឡើងទៅ។ ការដាំដុះ១ដង កសិករអាចប្រមូលផលបន្តគ្នាយ៉ាងតិចពី ៧ ទៅ ១០វគ្គ
ឬលើស បើមានការថែទាំបានល្អ និងមិនមានការរាតត្បាតដោយសារជំងឺទេនោះ (ចំណាយដូចគ្នានឹងវគ្គ
ទី២។ ចំពោះទិន្នផលអាចថយចុះចាប់ពីវគ្គទី៦ទៅ) ។

៧-បញ្ហាប្រឈម

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅកសិដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុក
ឈូក ខេត្តកំពត ការដាំដំណាំចេកអំបូងលឿងអាចមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា៖

បញ្ហាប្រឈម	ដំណោះស្រាយ
- ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ - ការរាតត្បាតដោយសារជំងឺដំណាំ	- ប្រើថ្នាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទសត្វល្អិត និងជំងឺ ដោយពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ - ធ្វើដីសុវត្ថិភាពលើការចេញ-ចូលនៃបុគ្គលិកកម្មករ និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជួនផ្សេងៗនៅកសិដ្ឋាន។
ករណីកម្ពស់ទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំក្រោម១,០០០មីលីម៉ែត្រ គ្រោះរាំងស្ងួតយូរ និងខ្វះប្រភពទឹកបម្រុង ធ្វើឱ្យប៉ះ ពាល់ដល់ដំណាំចេក ការលូតលាស់យឺត និងការចេញ ត្រួយងតូច ស្លឹកតិច ផ្លែតិចនិងតូច	ត្រូវមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រោចស្រព (ដោយផ្ទៃដី១ហិកតាត្រូវការស្រះទឹកទំហំ ១២,០០០ម៉ែ ^៣) ដោយស្រោច ១០លីត្រ ទៅ២០លីត្រ/ដើម/ថ្ងៃ ឬច្រើន ជាងនេះរឹតតែប្រសើរក្នុងដោយអង្កេតមើលសំណើមដី ជាប្រចាំ។

- ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើននៅពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដាំដុះដំណាំចេកដំបូងលឿង	- ត្រៀមថវិកាបម្រុងសម្រាប់ការចំណាយ ដូចជាការប្តូរទឹកស្រោចស្រពនៅពេលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងរយៈពេល៦ខែ ឬលើសពីនេះ - ត្រូវកត់ត្រាបញ្ជីចំណាយ ចំណូលឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់
- ការប្រែប្រួលតម្លៃនៃធាតុចូលកសិកម្មដែលលើសពីការគ្រោងទុក	- ត្រូវត្រៀមថវិកាបម្រុងបន្ថែមលើថ្លៃធាតុចូលកសិកម្ម - ជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត - ប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់ក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយដូចជាផលិតផលកំប៉ុស្តរន្ធនិង - ការប្រើប្រាស់ដីស្រស់ដូចជាដំណាំគម្របដី ពពួកសណ្តែក និងផ្សេងៗ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពដីដោយការភ្ជួរលុប ឬកិនពង្រាប និងវាយកំទេចឱ្យក្លាយជាជីជាតិឱ្យជីវិញ ហើយបន្ទាប់មកក្លាយជាសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំចេក។

៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដំណាំចេកដំបូងលឿងមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចជា៖

- ផ្តល់ផលលឿនត្រឹមអាយុជាមធ្យម៨ខែ អាចប្រមូលផលផ្តែបាន
- ងាយស្រួលថែទាំជាងដំណាំឈើហូបផ្លែដទៃទៀត ដោយការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ដីអស់តិច
- អាចផ្តល់ផលជាមធ្យម ២២-៣០គ.ក/ស្មង/ដើម, មាន៧ ទៅ១០ស្លឹក/ស្មង, និង១៦ ដល់១៨ផ្លែ/ស្លឹក
- មានកូនដុះបន្តក្រោយប្រមូលផល មិនបាច់នឿយក្នុងការដាំកូនថ្មីទៀត ដាំ១វគ្គបានផលបន្ត៧ ទៅ ១០វគ្គបន្តៗគ្នា ឬអាចលើសពីនេះ អាស្រ័យលើការថែទាំ
- មានទីផ្សារធំទូលាយជាពិសេសប្រទេសចិន និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយគ្រាន់តែអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃភូតតាមអនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់។
- តាមរយៈនៃការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថា ដំណាំចេកដំបូងលឿងទទួលបានផលចំណេញចាប់ពីវគ្គទី១ ឡើងទៅ។ តម្លៃជាមធ្យមពី ២,៧០០៛ ទៅ ៣,០០០៛/គ.ក។



ប្រភពសិក្សាស្រាវជ្រាវ ៖

- ១- សិក្សាផ្ទាល់លើការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់កសិករដាំដុះដំណាំចេកអំបូងលឿង
- ២- បទពិសោធន៍លើការដាំដុះដំណាំចេកអំបូងលឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកឈូក ខេត្តកំពត
- ៣- ឯកសារបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំចេក, នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- ៤- សៀវភៅណែនាំស្តីពីបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំចេកនៃគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការពង្រឹងផលិតកម្មកសិកម្ម និងទីផ្សារ
- ៥- <https://plantwiseplusknowledgebank.org/doi/full/10.1079/pwkb.species.15495>

