



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ដំណាំស្ពៃក្តោបក្នុងផ្ទះសំណាញ់



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ធន.អ.ជ.ក)

ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥

មាតិកា

១- សេចក្តីផ្តើម.....	១
២- ការអនុវត្តការដាំដុះ.....	១
ក- ការរៀបចំដី.....	១
ខ- ល្បាយដីបណ្តុះកូន.....	១
គ- ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក.....	១
ឃ- ការជ្រើសរើសពូជ.....	១
ង- វិធីដាំដុះ.....	២
ច- ការថែទាំ.....	២
ឆ- ការដាក់ជី.....	២
ជ- កត្តាចង្រៃ.....	២
ឈ- អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល.....	៤
៣- តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះស្ពៃក្តោបក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទំហំ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ.....	៤
៤- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះស្ពៃក្តោបក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទំហំ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ.....	៤
៥- លទ្ធភាពចំណេញផ្នែកលើនិន្នាការតម្លៃលើផ្ទៃដីដាំដុះ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ.....	៥
៦- ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ.....	៦
៧- ហានិភ័យ.....	៦
៨- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	៧

ដំណាំស្ពៃក្ដោបក្នុងផ្ទះសំណាញ់

១-សេចក្តីផ្តើម

ស្ពៃក្ដោបគឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ទីផ្សារ និងមានការពេញនិយមក្នុងការបរិភោគ។ កសិករកម្ពុជាបានអនុវត្តន៍ការដាំដុះដំណាំស្ពៃក្ដោបជាច្រើនទាំងនៅលើទីវាល និងក្នុងផ្ទះសំណាញ់។ ការដាំស្ពៃក្ដោបក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ទំនើប ដែលអាចជួយកសិករកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី និងធានាបាននូវគុណភាពដំណាំ។ ផ្ទះសំណាញ់អាចការពារដំណាំពីសត្វល្អិត និងកត្តាអាកាសធាតុមិនអំណោយផល ដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដាំដុះបានគ្រប់រដូវកាល។

២-ការអនុវត្តការដាំដុះ

ក. ការរៀបចំដី៖ កសិករត្រូវសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់ ដែលសមស្របទៅតាមសណ្ឋានដីជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែបណ្តោយផ្ទះសំណាញ់មិនគួរវែងជាង៥០ម៉ែត្រឡើយ ដោយសារសមត្ថភាពបញ្ជូនទឹករបស់ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹកមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងចម្ងាយក្រោម៥០ម៉ែត្រ។ ក្រោយសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់រួច កសិករត្រូវភ្ជួរដីឱ្យម៉ដ្ឋល្អ រួចហាលដីទុករយៈពេលពី ១០ ទៅ១៥ថ្ងៃ បន្ទាប់មកត្រូវរួតរូនជារងដែលមានទទឹងខ្នងលើ ១-១.២ម៉ែត្រ និងមានកម្ពស់រង ១០-២០ សង់ទីម៉ែត្រ ដោយទុកចន្លោះពីពាក់កណ្តាលរងមួយទៅពាក់កណ្តាលរងមួយប្រវែង ១.៥ម៉ែត្រ ដាំ ២-៣ជួរ ដើម្បីឱ្យស្ពៃក្ដោបមានទំហំឆ្អឹងតបទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ មុនពេលដាំ ត្រូវប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ និងជីគីមីទ្រាប់បាត ស្របតាមបច្ចេកទេស និងគុណភាពដី។

ខ. ល្បាយដីបណ្តុះកូន ៖ ល្បាយដីបណ្តុះកូនដំណាំស្ពៃក្ដោបរួមមាន៖ ដីដំបូក ឬដីទន្លេ ១/៣ ធ្យូងអង្កាមនិងស្រកីដូងម៉ដ្ឋ ១/៣ កំប៉ុស១/៣ ដោយច្របល់ចូលគ្នា បន្ទាប់មកយកទៅលីង ឬចំហុយសម្លាប់មេរោគ និងគ្រាប់ស្មៅចង្រៃ។ កូនដំណាំស្ពៃក្ដោបអាចប្រើប្រាស់វិធីការពារសត្វល្អិត និងជំងឺ ដោយប្រើប្រាស់វិធានការជីវសាស្ត្រ និងវិធានការគីមី។

គ. ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក៖ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹកទ្រីប គឺសមស្របសម្រាប់ដំណាំស្ពៃក្ដោប។

ឃ. ការជ្រើសរើសពូជ៖ កសិករអាចជ្រើសរើសពូជស្ពៃក្ដោបមួយចំនួនដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជា។




Green Eagle313



KNOWN YOU
Tropical Delight



East-West Seed
INDICA F1



CHIA TAI
GREEN 79

ង. វិធីដាំដុះ៖ កសិករត្រូវយកកូនស្ពៃក្ដោបដែលបណ្តុះបានអាយុពី១៨ ទៅ ២១ថ្ងៃ ពីថាសបណ្តុះមកដាំលើរងដែលបានរៀបចំហើយ ដោយដាំចន្លោះគុម្ព ៤០ស.មសម្រាប់ដាំ៣ជួរ និង៥០-៦០ស.មសម្រាប់ដាំ២ជួរលើរងតែមួយ។



ច. ការថែទាំ៖ នៅពេលកូនដំណាំនៅតូច គប្បីតាមដានការស្រោចស្រពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីប្រាកដថាកូនដំណាំមិនខ្វះទឹក និងជំងឺរលាកគល់។ បន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេល៣ថ្ងៃឡើងទៅ ត្រូវមានកាលវិភាគប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវសាស្ត្រ និងថ្នាំពុលកសិកម្មសម្រាប់បង្កាច់ជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗជាមុន។ កសិករចាំបាច់ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យដំណាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឈានដល់ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃបានល្អប្រសើរ។ នៅពេលដែលមានកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងនៅរដូវប្រាំង គប្បីប្រើប្រាស់ស្បែកការពារពន្លឺ កម្ដៅ ដើម្បីឱ្យកូនដំណាំស្ពៃក្ដោបមានលទ្ធភាពដុះលូតលាស់បានល្អប្រសើរ។

ឆ. ការដាក់ជី៖ ដំណាំស្ពៃក្ដោបក្រោយពេលដាំដុះលើរងរួចរាល់ ត្រូវមានកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជីដែលបរិមាណជីគឺប្រើប្រួលទៅតាមស្ថានភាពលូតលាស់របស់ដំណាំ។ កសិករអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទជីទឹកនៅដំណាក់កាលលូតលាស់ដោយដាក់បញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក និងបាញ់បន្ថែមទៅលើស្លឹក។ សារធាតុជីចម្បងៗមានបីប្រភេទគឺ៖ N P K ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការដុះលូតលាស់ដំណាំស្ពៃក្ដោបបានល្អ និងមានទម្ងន់ធ្ងន់។ សារធាតុបន្ថែម Trace Element(TE)ពិតជាមួយចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់គុណភាពផលិតផល ទិន្នផល និងរូបរាងស្រស់ស្អាត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ។

ជ. កត្តាចង្រៃ៖ ជាទូទៅកសិករតែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់នូវកត្តាចង្រៃមានដូចជា៖ ដង្កូវស៊ីបណ្ណាលស្ពៃ ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវហ្វូង ទាកតូ អេហ្វីត ជំងឺរលាកគល់កូនដំណាំ និងជំងឺបាក់តេរី។



ដង្កូវស៊ីបណ្តាល




ដង្កូវយោលទោង



ដង្កូវហ្វូង



ទាកតូ



អេហ្វីដ



ជំងឺផ្សិត



ជំងឺបាក់តេរី

ឈ. អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល៖ ស្ពៃក្តោបអាចប្រមូលផលនៅអាយុ ៩០ថ្ងៃ ក្រោយពេលបណ្តុះកូន ឬស្ពៃក្តោបមានទម្ងន់ចាប់ពី ១គីឡូក្រាមឡើងទៅ។ វិធីសាស្ត្រប្រមូលផលស្ពៃក្តោបកសិករត្រូវប្រើកាំបិតមុតកាត់ផ្តាច់គល់ កាត់ស្លឹកមួយចំនួនចេញ បន្ទាប់មកអាចច្រកក្នុងថង់ ឡាំងកេះដែលធ្វើពីជ័រ ឬក្រដាសស្នូត។ ទិន្នផលស្ពៃក្តោបគឺអាស្រ័យលើចំនួនគុម្ពដែលដាំដុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់ និងប្រភេទពូជ។

៣-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះស្ពៃក្តោប ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទំហំ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ

បរិយាយ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)
ចំណាយលើការដាំដុះ	640,000
ចំណាយលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព	4,160,000
សម្ភារៈផ្សេងៗ	10,920,000
សរុប	15,720,000

៤-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះស្ពៃក្តោប ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទំហំ ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ

- បទពិសោធន៍៖ ការដាំដុះរបស់កសិករនៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង
- ទិន្នផលមធ្យម៖ ១,២០០ គ.ក
- តម្លៃលក់៖ ១,៨០០រៀល/គ.ក
- ចំនួនវគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ៖ ៣វគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួនឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	ទឹកប្រាក់ (រៀល)	ចំនួនសារវិលស	ទឹកប្រាក់សរុប (រៀល)
១-ចំណូលពីការលក់	គ.ក	1,200	1,800	2,160,000		2,160,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល						1,653,333
២.ក-ចំណាយប្រែប្រួលសរុប						640,000
ភ្នំដី	លើក	2	20,000	40,000		40,000
ពូជ	កញ្ចប់	1	40,000	40,000		40,000
ដីកំប៉ុស (លាមកតោ)	តោយន្ត	1	50,000	50,000		50,000
ដីដេអាប៉េ (18-46-0)	គីឡូ	10	4,000	40,000		40,000
ដីកាលី (0-0-60)	គីឡូ	10	4,000	40,000		40,000

ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត + ជំងឺ	ឈុត	1	40,000	40,000		40,000
ថ្លៃកម្មករដាំ និងថែទាំ	នាក់/ថ្ងៃ	10	30,000	300,000		300,000
ថ្លៃអគ្គីសនី	វត្ថុ	1	60,000	60,000		60,000
ចំណាយផ្សេងៗ	វត្ថុ	1	30,000	30,000		30,000
២.១-ចំណាយមិនប្រែប្រួលសរុប						1,013,333
ផ្ទះសំណាក់(ប្រើ៥ឆ្នាំ)	ផ្ទះ	1	8,000,000	8,000,000	15	533,333
ប្រព័ន្ធទឹក (ប្រើ២ឆ្នាំ)	ឈុត	1	800,000	800,000	6	133,333
ម៉ូទ័របូមទឹក(ប្រើ៣ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	240,000	240,000	9	26,667
អណ្តូងទឹក (ប្រើ១០ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	3,000,000	3,000,000	30	100,000
ធុងបាញ់ថ្នាំ (ប្រើ៣ឆ្នាំ)	ឈុត	1	120,000	120,000	9	13,333
ម៉ាស៊ីនវាយដី (ប្រើ៥ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	2,800,000	2,800,000	15	186,667
កៅស៊ូស្តុកទឹក (ប្រើ២ឆ្នាំ)	ឈុត	1	120,000	120,000	6	20,000
៣-ចំណេញសរុប						506,667
ថ្លៃដើមផលិត/គ.ក = ចំណាយសរុប/ទិន្នផលសរុប						1,378
ចំណេញ/គ.ក = ចំណេញសរុប/ទិន្នផលសរុប						422

៥-លទ្ធភាពចំណេញផ្អែកលើទិន្នន័យការតម្លៃ ÷ (លើផ្ទៃដីដាំដុះ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ)

- តម្លៃទាបបំផុត ១,០០០\$ / គ.ក
- តម្លៃខ្ពស់បំផុត ៣,០០០\$ / គ.ក

ទិន្នផល គ.ក	តម្លៃ រៀល/គ.ក	ចំណូល រៀល	ចំណាយ រៀល	ចំណេញ-ខាត	
				រៀល	%
1,200	1,000	1,200,000	1,653,333	-453,333	-27.42%
1,200	1,500	1,800,000	1,653,333	146,667	8.87%
1,200	1,800	2,160,000	1,653,333	506,667	30.65%
1,200	2,000	2,400,000	1,653,333	746,667	45.16%
1,200	2,500	3,000,000	1,653,333	1,346,667	81.45%
1,200	3,000	3,600,000	1,653,333	1,946,667	117.74%

៦-ខ្សែប្រចារកំរិតថ្លៃ ÷

- **កសិករ ÷** លក់ ១,៨០០\$ / គ.ក - ថ្លៃដើម ១,៣៧៨\$ / គ.ក = ចំណេញ ៤២២\$ / គ.ក
- **ឈ្មួញកណ្តាល ÷** លក់ ២,៣០០\$ / គ.ក (ថ្លៃដឹកជញ្ជូន ២០០\$ / គ.ក) ចំណេញ ៣០០\$ / គ.ក
- **អ្នកលក់រាយ ÷** លក់ ៣,០០០\$ / គ.ក (ជួលតូប និងខូចខាត ៣០០\$ / គ.ក) ចំណេញ ៤០០\$ / គ.ក

៧-ហានិភ័យ ÷

តាមការសិក្សាផ្ទាល់ជាមួយកសិករដាំដុះស្ពៃក្តោបនៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង អាចមានហានិភ័យមួយចំនួនកើតឡើងដោយហេតុលើដំណើរការដាំដុះដំណាំស្ពៃក្តោបដូចជា ÷

ប្រភេទ ហានិភ័យ	ពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការ
ហានិភ័យ ផលិតកម្ម	ទិន្នផលធ្លាក់ចុះបណ្តាល មកពី ÷ - កត្តាសត្វល្អិតចង្រៃ - កត្តាជំងឺដំណាំ - កត្តាគុណភាពដី	- គួរប្រើប្រាស់វិធានការការពារដំណាំ និងមានកាលវិភាគ ប្រើប្រាស់ថ្នាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់សត្វល្អិត និងជំងឺ - ប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវសាស្ត្រ មុនពេលចាប់ផ្តើមដាំដុះ - ជ្រើសរើសពូជធន់នឹងកត្តាចង្រៃ ពូជបង្កាត់ - សិក្សាការកែប្រែគុណភាពដី និងបន្ថែមការគ្រប់គ្រងដីឱ្យ ស្របតាមតម្រូវការជីរបស់ដំណាំស្ពៃក្តោប ជាពិសេសដីដែលមានសារធាតុអាសូតខ្ពស់
ហានិភ័យ ទីផ្សារ	ពីខែកុម្ភៈ ដល់ ឧសភា មានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃ ដោយសារការផលិតច្រើន និងអាកាសធាតុអំណោយ ផល	- ពង្រីកបណ្តាញទីផ្សារឱ្យបានច្រើន និងព័ត៌មាន ទីផ្សារជាប្រចាំ ដើម្បីពង្រឹងទីផ្សារ - ចងក្រងក្រុមផលិត ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ-លក់ និង ធ្វើផែនការផលិតតាមកិច្ចសន្យា - ផលិតដំណាំចម្រុះ ជាជាងដំណាំតែមួយមុខ - ស្វែងរកព័ត៌មាននៃការដាំដុះនៅតំបន់ផ្សេងៗ ដើម្បីជ្រើសរើសមុខដំណាំសម្រាប់ដាំដុះ

៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ស្តែក្តោបគឺជាបន្ថែមប្រភេទដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចល្អ និងអាចដាំដុះបានគ្រប់រដូវកាល។ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព កសិករគួរប្រើប្រាស់ផ្ទះសំណាញ់សម្រាប់ការដាំដុះ ដោយសារតែអាចការពារពី សត្វល្អិត និងអាកាសធាតុដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណាំ។ ការប្រើប្រាស់ផ្ទះសំណាញ់អាចជួយកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី និងជាជម្រកដ៏ល្អសម្រាប់ដំណាំក្នុងការលូតលាស់។ ដើម្បីដាំដុះស្តែក្តោបក្នុងផ្ទះ សំណាញ់ កសិករត្រូវជ្រើសរើសដីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អគ្រប់គ្រាន់ និងមានប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក សម្រាប់ការស្រោចស្រពដំណាំសមរម្យ។ ក្រៅពីនេះការថែទាំដំណាំក៏មានសារៈសំខាន់ដល់ដំណើរការ លូតលាស់របស់ស្តែក្តោបផងដែរ ដោយកសិករត្រូវត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិតចង្រៃ ជំងឺដំណាំ និងបន្ថែមជី ឱ្យសមរម្យស្របតាមតម្រូវការនៃការលូតលាស់។ ប្រសិនបើសង្កេតឃើញមានសត្វល្អិតចង្រៃ កសិករ អាចប្រើវិធីធម្មជាតិ វិធានការជីវសាស្ត្រ វិធានការគីមី ដើម្បីការពារដំណាំពីការខូចខាត និងការបំផ្លាញ។ បច្ចុប្បន្នកសិករជាច្រើនបានជំរុញការដាំដុះស្តែក្តោបក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ដោយសារអាចការពារការបំផ្លាញពី សត្វល្អិតចង្រៃបានល្អប្រសើរ អាចដាំបានគ្រប់រដូវកាល បង្កើនផលិតភាព និងមានលទ្ធភាពចំណេញ បានល្អប្រសើរ។

