



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ចិញ្ចឹមក្តាបដ្ឋនោក្ខន្ធរូបៈ



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB)

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម.....	1
២-លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ក្តាមថ្ម.....	1
៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្តាមថ្មក្នុងស្រះ.....	2
៣.១. ការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម.....	2
៣. ២. ការដាក់កូនក្តាមថ្មពូជ.....	2
៣. ៣. ចំណី និងការផ្តល់ចំណី.....	3
៣. ៤. ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំ.....	4
៣. ៥. ការបង្ការជំងឺ.....	4
៣. ៦. ការប្រមូលផល.....	5
៤-គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម.....	6
៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម.....	6
៤-២- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចការចិញ្ចឹមក្នុង១វគ្គ.....	6
៤-៣- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់.....	7
៤-៤- ការវិភាគលើខ្សែច្រវាក់តម្លៃ.....	8
៥-ហានិភ័យ-បញ្ហាប្រឈម.....	8
៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	9
ប្រភពឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ.....	10

១-សេចក្តីផ្តើម

ក្តាមថ្មគឺជាប្រភេទសត្វទឹកប្រៃដែលមិនសូវលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមថែទាំ ដោយចំណាយទុនតិចហើយ អាចឆាប់ទទួលផល បើសិនជាកសិករមានទីតាំង និងលក្ខខណ្ឌសមស្របក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មមួយនេះ។ ប្រជាកសិករដែលរស់នៅតំបន់ទឹកភ្នំ និងទឹកប្រៃអាចប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមបាន ពីព្រោះផលិតផលក្តាមថ្ម មានតម្រូវការក្នុងទីផ្សារ និងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។ ការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មអាចមានច្រើនរបៀប ដូចជាការចិញ្ចឹម ក្នុងស្រះ ក្នុងអាងស៊ីម៉ង់ត៍ ឬការចិញ្ចឹមដាក់ក្នុងប្រអប់ ដោយផ្តល់ចំណីចម្រុះ (ប្រភេទចំណីក្រៀម និង ស្រស់) មានដូចជា៖ កូនត្រីល្អិត ខ្យង កូនបង្ការ ក្តាម។ល។ ការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មរបស់កសិករកម្ពុជាភាគច្រើន មានលក្ខណៈជាការចិញ្ចឹមបែបបំប៉នកូនក្តាម ដែលអ្នកនេសាទអាចចាប់បានពីធម្មជាតិនៅចន្លោះខែឧសភា ដល់ខែកញ្ញា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមមានការកើនឡើង បានបង្កផល លំបាកដល់ការទិញកូនក្តាមពូជពីអ្នកនេសាទ។ ក្រៅពីនេះ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងជំនោរទឹកសមុទ្រ ក៏ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មផងដែរ។

២-លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ក្តាមថ្ម ៖

ក្តាមថ្មគឺជាប្រភេទសត្វទឹកប្រៃរស់នៅក្នុងដីល្បាប់ភក់តាមព្រៃកោងកាងនៃតំបន់ឆ្នេរនិងដែសមុទ្រ។ ក្តាមថ្មមានរាងកាយសំប៉ែតគ្របដណ្តប់ដោយសំបក និងស្លឹកដ៏រឹងមាំ នៅតាមតែមុខខាងមុខនៃស្លឹកមាន បន្ទាចចំនួនប្រាំមួយនៅចន្លោះភ្នែកទាំងពីរ និងបន្ទាចចំនួនប្រាំបួននៅអមសងខាង មានដង្ហើបមួយគូ ជើងដើរបីគូ រួមនឹងជើងទីបួនមួយគូដែលមានចុងរាងសំប៉ែតប្រើសម្រាប់ហែលទឹក ឬហៅថាជើងហែលទឹក។ ចំពោះក្តាមឈ្មោល ជើងទីបួននេះប្រើដើម្បីចាប់ក្តាមញឹកក្នុងពេលបន្តពូជ ចំណែកក្តាមញឹកប្រើសម្រាប់ កោសពងមុនពេលញាស់។



ក្តាមថ្ម
Scylla Serrata
Giant Mud

ដំណាក់កាលដំបូង ក្តាមថ្មមានចរិតស៊ីចំណីប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិប្លង់តុង នៅពេលក្តាមពេញវ័យ វាស៊ីប្រភេទកូនត្រី បង្កង បង្កា ខ្យង សត្វល្អិតតូចៗ សាវ៉ាយ ស្ពែរ និងប្រភេទរុក្ខជាតិទឹកមួយចំនួន។ ក្តាមថ្ម ត្រូវការសកដើម្បីលូតលាស់ និងធំធាត់ឡើងចន្លោះពី ២០-៥០% នៃទំហំដងខ្លួនក្នុងការសកម្មភាព។ ក្រោយ ពេលសក ស្លឹក ដងខ្លួនក្តាមទាំងមូលរួមទាំងជើង និងដង្ហើបផងមានសភាពទន់ ជ្រាយ ដែលងាយនឹងរង គ្រោះថ្នាក់ដោយប្រភេទសត្វផ្សេង ឬក្តាមថ្មផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងស្រះចាប់ធ្វើជាចំណី។

អាយុកាលជាមធ្យមរបស់ក្លាមថ្មចន្លោះពី ២-៤ឆ្នាំ មានទំហំខ្លួនចន្លោះពី ១៩-២៨សង់ទីម៉ែត្រ និង ទម្ងន់ពី ១-៣គីឡូក្រាមក្នុង១ក្បាល ដោយជាទូទៅគេសង្កេតឃើញក្លាមថ្មឈ្មោលធ្ងន់ជាងក្លាមថ្មញី។

៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្លាមថ្ម ៖

បច្ចេកទេសសំខាន់ៗនៃការចិញ្ចឹមក្លាមថ្មតាមបែបពាក់កណ្តាលប្រពលវប្បកម្មដែលជាចំណេះដឹង បន្ថែមដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជា រួមមានដូចខាងក្រោម៖

៣.១. ការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹមក្លាមថ្ម៖

ស្រះចិញ្ចឹមក្លាមថ្ម ត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងនៅក្បែរប្រភពទឹក ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញបញ្ចូលទឹក ជាតំបន់ដែលគ្មានសារធាតុពុល ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ការបំពុលសរីរាង្គ និងថ្នាំគីមី។ ស្រះគួរមានទំហំធំ ទូលាយចាប់ពី ៥ ០០០ម^២ ជម្រៅចន្លោះពី ១-១.៨ម៉ែត្រ និងបាតស្រះគួរជាដីឥដ្ឋឬខ្សាច់ មានភក់ទាបជាង ២០សង់ទីម៉ែត្រ។ កម្រិត pH ទឹកចន្លោះពី ៧.៥-៨.២ កម្រិតប្រៃចន្លោះពី ១០-២៥‰ សីតុណ្ហភាពចន្លោះពី ២៥-៣៥អង្សាសេ។ ត្រូវជីកប្រឡាយជុំវិញស្រះជម្រៅ ០.៥-០.៧ម៉ែត្រ ទទឹង ១-២ម៉ែត្រ ឬបង្កើតតំបន់ទឹក ជ្រៅទំហំពី ១០-១០០ម^២ អាស្រ័យលើទំហំស្រះចិញ្ចឹម ដើម្បីឱ្យក្លាមអាចផ្លាស់ទីរកតំបន់ទឹកដែលមាន លក្ខខណ្ឌសមស្រប។ ស្រះចិញ្ចឹមត្រូវបាចកំបោរកសិកម្ម ៥០គីឡូក្រាម/១០០០ម^២ ហើយហាលស្រះរយៈ ពេលពី ៧-១០ថ្ងៃ។ ស្រះត្រូវហ៊ុមស្បែកប្រឡាយឬស្បែកម្តុស ១ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញស្រះ ដើម្បីការពារក្លាមវារចេញ ពីស្រះ។ បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រះជម្រៅ ១ម៉ែត្រ និងបង្កើតចំណីធម្មជាតិដោយប្រើជីអុយរ៉េ ២ គីឡូក្រាម/១០០០ម^២ និងជីដេអាប៉េ ១គីឡូក្រាម/១០០០ម^២។



៣.២. ការដាក់កូនក្លាមថ្មពូជ៖

ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលចិញ្ចឹម កសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជ្រើសរើសកូនក្លាម ដែលមានសុខភាពល្អ ពណ៌សម្បុរភ្លឺថ្លា រត់លឿនខ្លាំង រហ័សរហួន មិនបាក់ជើង មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។ ប្រសិនបើកសិករជ្រើសរើសកូនក្លាមពូជចេញពីកសិដ្ឋានបង្កាត់ភ្ជាស់ ក្លាមត្រូវមានទំហំចន្លោះពី២-៥សង់ទីម៉ែត្រ ចំណែកកូនក្លាមពីធម្មជាតិគួរជ្រើសរើសទម្ងន់ចន្លោះពី១០- ១០០ក្រាម ហើយដងស៊ីតេដាក់ចិញ្ចឹមចន្លោះពី ១-៣ក្បាល/ម^២ ។

គួរលែងកូនក្ដាមរាយពេញផ្ទៃស្រះ ដោយដាក់កូនក្ដាមនៅមាត់ស្រះឱ្យក្ដាមវាចូលស្រះដោយខ្លួនឯងនៅពេលចន្លោះម៉ោង៧-៩ព្រឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប។មុនពេលលែងកូនក្ដាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកម្រិតប្រេនទឹកក្នុងស្រះ មិនត្រូវឱ្យមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងពីទឹកនៅក្នុងធម្មជាតិដែលក្ដាមរស់នៅទេ។



៣.៣. ចំណី និងការផ្តល់ចំណី៖

ការចិញ្ចឹមក្ដាមក្នុងស្រះ ពឹងផ្អែកច្រើនលើប្រភពចំណីធម្មជាតិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រះ នៅពេលសង្កេតឃើញថាចំណីធម្មជាតិកាន់តែចុះទាប ទើបកសិករចាប់ផ្តើមដាក់ចំណីផ្សំដោយខ្លួនឯងបន្ថែម។ ចំណីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ក្ដាមគឺជាចំណីស្រស់ឬចំណីក្រៀមមានដូចជា៖ កូនត្រីចម្រុះ ខ្យង កូនបង្ការ... បើសិនជាក្រៀមត្រូវត្រាំទឹកធ្វើឱ្យចំណីទន់ជាមុនសិន។ បរិមាណចំណីប្រចាំថ្ងៃចន្លោះពី ៤-៦%នៃទម្ងន់កូនក្ដាមសរុបក្នុងស្រះ។ ការផ្តល់ចំណីត្រូវដាក់ពី ២-៤ដង/ថ្ងៃ អាស្រ័យលើដំណាក់កាលលូតលាស់។ពេលកូនក្ដាមនៅតូចត្រូវដាក់៣-៤ដង/ថ្ងៃ ក្ដាមកាន់តែធំអាចដាក់២ដង/ថ្ងៃ។ ដោយសារក្ដាមចាប់ចំណីខ្លាំងនៅ



ពេលយប់ កសិករត្រូវផ្តល់ចំណី១ដងនៅចន្លោះម៉ោង ៥-៧យប់ ដោយបាចចំណីនៅជុំវិញស្រះដើម្បីកាត់បន្ថយការដណ្តើមចំណីគ្នា និងដាក់ចំណីក្នុងកញ្ចែងចម្ងាយ ១០ម៉ែត្រពីគ្នា ដើម្បីពិនិត្យលើការស៊ីចំណី។ ក្រោយពេល ពី២-៣ម៉ោង បើពិនិត្យឃើញក្ដាមស៊ីចំណីអស់ កសិករត្រូវបន្ថែមចំណី ប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញចំណីនៅសល់ កសិករត្រូវបន្ថយចំណីនៅថ្ងៃបន្ទាប់។

៣.៤. ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំ៖

➢ ដើម្បីធានានូវគុណភាពទឹកក្នុងស្រះបានល្អ ជួយជំរុញឱ្យក្លាយមានសកម្មភាពឬធ្វើបម្លាស់ទីច្រើន ស៊ីចំណីខ្លាំង សកបានល្អ និងលូតលាស់លឿន ស្រះគួរមានប្រព័ន្ធបញ្ឆោតបញ្ចូលទឹកស្របជាមួយរបបទឹក ជោរ នាចនៃទឹកសមុទ្រដែលអាចផ្លាស់ប្តូរទឹកស្រះបានជាប្រចាំ។ ស្រះដែលមិនមានប្រព័ន្ធបញ្ឆោតបញ្ចូល ទឹក កសិករត្រូវបូមផ្លាស់ប្តូរទឹក ១-២ដង/ខែ ក្នុងបរិមាណទឹកពី ២០-៣០% ជាពិសេសនៅចុងនៃវគ្គ ចិញ្ចឹមទម្ងន់ក្លាយបានកើនឡើង និងស៊ីចំណីច្រើននាំឱ្យទឹកងាយខូចគុណភាព ដូចនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យ និង ផ្លាស់ប្តូរទឹកស្រះឱ្យបានទៀងទាត់។

តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃគុណភាពទឹក៖

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃគុណភាពទឹក	កម្រិតសមស្រប
១	pH	៧.៥-៨.៥
២	អុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹក (DO)	> ៣ មីលីក្រាម/លីត្រទឹក
៣	កំហាប់អំបិល/កម្រិតប្រៃ	១៥-២៥ ភាគពាន់
៤	សីតុណ្ហភាពទឹក	២៦-៣០ អង្សាសេ

➢ ចាប់កូនក្លាយធ្វើសំណាក១-២ដង/ខែ ដើម្បីកំណត់ទម្ងន់ក្លាយជាមធ្យមក្នុង១ក្បាល ទម្ងន់ក្លាយសរុប ក្នុងស្រះ វាយតម្លៃការលូតលាស់ កំណត់បរិមាណចំណីត្រូវផ្តល់ ពិនិត្យរូបរាង សុខភាព កំណត់បាននូវ បញ្ហា និងអាចដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលា។

➢ ឧស្សាហ៍ពិនិត្យ ថែទាំភ្លឺស្រះ របាំងការពារជុំវិញស្រះ និងប្រព័ន្ធបញ្ឆោតបញ្ចូលទឹក។




៣.៥. ការបង្ការជំងឺ ៖

នៅក្នុងវារីវប្បកម្ម ក្លាយថ្មត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្វដែលកើតជំងឺតិចតួចបំផុត បើធៀបនឹងបង្កា ត្រី និងប្រភេទសត្វសមុទ្រផ្សេងៗទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏អាចមានករណីមួយចំនួនដែលបណ្តាលឱ្យក្លាយ ឈឺ ហើយជំងឺទាំងនេះក៏ស្រដៀងទៅនឹងជំងឺនៅលើសត្វបង្កា និងបង្កងផងដែរ។ ក្នុងធម្មជាតិ ករណីក្លាយ កើតមានជំងឺគឺមានកម្រិតទាប ប៉ុន្តែនៅពេលកសិករចាប់ផ្តើមអនុវត្តការចិញ្ចឹមតាមបែបប្រពលវប្បកម្ម ឬ

ការតម្កើងដងស៊ីតេនៃកូនក្ដាមខ្ពស់ពេក នាំឱ្យអត្រាកើតឡើងនៃជំងឺកាន់តែខ្ពស់ ដូចនេះកសិករត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិធីបង្ការជំងឺមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- ស្រះត្រូវរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលដាក់ចិញ្ចឹម៖ ត្រូវសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីស្រះ ឬមួយបាតកំបាតស្រះឱ្យនៅត្រឹមកម្រិតទាបបំផុត និងហាលស្រះទុករយៈពេលពី ៥-១០ថ្ងៃ។
- បាចកំបោរកសិកម្មសម្លាប់មេរោគជំងឺវិញស្រះ និងក្នុងស្រះក្នុងកម្រិត ៥គីឡូក្រាម/១០០ម៉ែ^២
- ដាក់កូនក្ដាមចិញ្ចឹមក្នុងកម្រិតសមស្របតាមបច្ចេកទេស ផ្តល់ចំណីឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- គ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកឱ្យបានសមស្រប ជាពិសេសកម្រិត pH និងកម្រិតប្រៃនៃទឹក
- កូនក្ដាមពូជដាក់ចិញ្ចឹមមានសុខភាពល្អ គ្មានជំងឺ និងមានទំហំចាប់ពី ១.៥សង់ទីម៉ែត្រឡើង
- មុនពេលលែងចូលស្រះកូនក្ដាមត្រូវសម្លាប់មេរោគ ដោយ Formalin ២០-៣០ ppm ឬប្រើសូលុយស្យុង Copper Sulfate ២-៤ ppm ត្រាំកូនក្ដាមពី ២០-៣០នាទី។
- ចំណីដាក់ឱ្យក្ដាមស៊ីជាប្រភេទចំណីស្រស់មិនខូចគុណភាព



៣.៦. ការប្រមូលផល៖

បន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបានរយៈពេលពី ៤-៦ខែ ក្ដាមថ្មមានទម្ងន់ចន្លោះពី ០.១-០.៣គ.ក/ក្បាល ឬចំនួនកូនក្ដាមថ្មពី ៣-១០ក្បាល/គ.ក កសិករអាចចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលរំលស់ ដោយចាប់ក្ដាមដែលមានទំហំធំត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារ ហើយរក្សាទុកកូនក្ដាមមានទំហំតូចចិញ្ចឹមបន្ត។ ការប្រមូលផលរំលស់កសិករប្រើឧបករណ៍លបកន្ទុយកណ្តុរ ឬលបប្រីស១០០ ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់គុណភាពក្ដាម។ ការប្រមូលផលសម្រេចធ្វើឡើងក្រោយពេលចិញ្ចឹមបាន ១០ខែ ឬនៅពេលកូនក្ដាមនៅសល់ត្រឹម១០-២០% ដោយការប្រមូលទឹកពង្រឹង និងចាប់យកកូនក្ដាមទាំងអស់តែម្ដង។ កសិករមួយចំនួនបានដាក់កូនក្ដាមពូជចិញ្ចឹមនៅវគ្គបន្តតែម្ដងដោយមិនបានសម្អាតស្រះឡើងវិញនោះទេ បើសិនជាពិនិត្យឃើញគុណភាពទឹកនៅល្អ និងល្បាប់ភក់មានតិចតួច។



៤-គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមក្ដាមថ្ម ÷

៤-១-គម្រោងចិញ្ចឹម (បទពិសោធន៍របស់កសិករចិញ្ចឹមក្ដាមថ្ម នៅខេត្តកំពត)

- ទំហំស្រះចិញ្ចឹម ÷ ១០,០០០ម៉ែ^២ (១ហិកតា)
- ចំនួនកូនក្ដាមពូជ/វគ្គ ÷ ១០,០០០ក្បាល
- រយៈពេលចិញ្ចឹម ÷ ១០ខែ/វគ្គ
- ចំណី ÷ បន្លែមចំណីត្រីនុយ និងចំណីធម្មជាតិនៅក្នុងស្រះ
- អត្រាបាត់បង់ ÷ មធ្យម ៤០% (អាស្រ័យលើទំហំ សុខភាពកូនពូជ និងការថែទាំ)
- ទិន្នផល ÷ មធ្យម ១,៥០០គ.ក/វគ្គ (ជាមធ្យម ០.២៥គ.ក/ក្បាល)
- ទីផ្សារ ÷ ឈ្នួញក្នុងតំបន់បញ្ជាទិញពីកសិដ្ឋានផ្ទាល់
- តម្លៃទីផ្សារ ÷ លក់បោះដុំតម្លៃជាមធ្យម ៥០,០០០រៀល/គ.ក
- តម្រូវការទុនសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង ដោយរៀបចំស្រះ និងបំពាក់សម្ភារៈ ÷

ទុនវិនិយោគសម្រាប់ដីកស្រះ និងបំពាក់សម្ភារៈ (រៀល)	ទុនសម្រាប់ដំណើរការ ចិញ្ចឹម (រៀល)	ទឹកប្រាក់សរុបសម្រាប់ចាប់ផ្ដើម អាជីវកម្មដំបូង (រៀល)
6,960,000	15,640,000	22,600,000

៤-២-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចការចិញ្ចឹមក្ដាមថ្មក្នុង១វគ្គ (រយៈពេល ១០ខែ) ÷

ការចិញ្ចឹមក្ដាមថ្ម ដោយដាក់កូនពូជចំនួន ១០,០០០ក្បាល ចិញ្ចឹមរយៈពេល ១០ខែ (ក្នុង១វគ្គ) មានអត្រាបាត់បង់ជាមធ្យម ៤០% និងក្រោយកាត់រំលស់ឧបករណ៍ សម្ភារៈ រួមមានដូចខាងក្រោម ÷

លរ	មុខចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ឯក តា (៛)	តម្លៃសរុប (៛)	ចំនួនវគ្គ រំលស់	តម្លៃសរុប/ វគ្គ (៛)
I-ចំណូលពីការលក់ក្ដាមសាច់							
1	ចំណូលពីការលក់	គ.ក	1,500	50,000	75,000,000		<u>75,000,000</u>
II-ចំណាយសរុប (ក + ខ)					22,600,000		<u>16,624,000</u>
ក-ការចំណាយប្រែប្រួល					15,640,000		15,640,000

1	កូនក្តាមពូជ	ក្បាល	10,000	1,000	10,000,000		10,000,000
2	កំបោរស	គ. ក	1000	2,000	2,000,000		2,000,000
3	ចំណី(ប្រភេទត្រីនុយ)	គ. ក	240	1,000	240,000		240,000
4	ប្រេងសាំងឬម៉ាស៊ូត/វត្ថុ	ខែ	4	400,000	1,600,000		1,600,000
5	ថ្នាំការពារ និងព្យាបាល (១វត្ថុ)	វត្ថុ	1	200,000	200,000		200,000
6	កម្លាំងពលកម្ម/វត្ថុ(២០%)	ខែ	4	400,000	1,600,000		1,600,000
ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ					6,960,000		984,000
1	ជីកស្រះ	ហិកតា	1	1,800,000	1,800,000	20	90,000
2	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក	គ្រឿង	1	1,200,000	1,200,000	10	120,000
3	ក្បាលម៉ាស៊ីនកិនចំណី	គ្រឿង	1	1,200,000	1,200,000	10	120,000
4	ទុយេបូមទឹក ទន់ (៥០ម/ ដុំ)	ដុំ	4	60,000	240,000	10	24,000
5	ស្បែកប៉ុស្តិ៍ស្រះ	គ. ក	100	10,000	1,000,000	4	250,000
6	បង្គោលឈើ	ដើម	200	2,000	400,000	4	100,000
7	លបមុខ១០០	វង់	20	20,000	400,000	4	100,000
8	ជញ្ជីងថ្មី(អេឡិចត្រូនិច-ប៉ុង)	គ្រឿង	2	260,000	520,000	4	130,000
9	តាកា ចានដែក ធុង...	ឈុត	1	200,000	200,000	4	50,000
III-ចំណេញសរុប							58,376,000
ចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មីក្នុង១ គ. ក							11,083
ចំណេញពីការផលិតក្តាមថ្មីសាច់ ១ គ. ក							38,917

៤- ៣- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើនិន្នាកាតម្តែលក់ ÷


តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កសិករដែលក្រុមការងារបានសិក្សាផ្ទាល់ ការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មីនៅក្នុងស្រះ មានអត្រាបាត់បង់ចន្លោះពី ៣០-៥០% អាស្រ័យលើសុខភាពកូនក្តាមពូជ ការគ្រប់គ្រង និងការថែទាំ។

ទិន្នផល (គ. ក)	តម្លៃលក់ (រៀល)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណាយសរុប (រៀល)	ចំណេញ (រៀល)	កំណត់សម្គាល់អំពីទិន្នផល
1,250	60,000	75,000,000	16,624,000	58,376,000	ករណីអត្រាបាត់បង់៥០%
	50,000	62,500,000	16,624,000	45,876,000	
	45,000	56,250,000	16,624,000	39,626,000	
1,500	60,000	90,000,000	16,624,000	73,376,000	ករណីអត្រាបាត់បង់៤០%
	50,000	75,000,000	16,624,000	58,376,000	
	45,000	67,500,000	16,624,000	50,876,000	
1,750	60,000	105,000,000	16,624,000	88,376,000	ករណីអត្រាបាត់បង់៣០%
	50,000	87,500,000	16,624,000	70,876,000	
	45,000	78,750,000	16,624,000	62,126,000	

សម្គាល់៖

ក្នុងករណីកូនក្តាមថ្មីៗដែលទិញបានពីធម្មជាតិមានសុខភាពមិនល្អ ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំមិនបានត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្តាមនាំឱ្យអត្រាបាត់បង់ខ្ពស់ និងផលចំណេញធ្លាក់ចុះ។ ដោយឡែកតម្លៃក្តាមថ្មីសាច់នៅលើទីផ្សារមានការប្រែប្រួលតិចតួច ក្នុងនោះប្រភេទក្តាមថ្មីសាច់លេខ១ ដែលមានទម្ងន់ ៣-៤ក្បាល/គ.ក លក់បានតម្លៃចន្លោះពី៥៥,០០០-៦០,០០០\$ /គ.ក និងប្រភេទលេខ០២ មានក្តាម៥ក្បាល/គ.ក លក់បានតម្លៃពី ៤៥,០០០-៥០,០០០\$ /គ.ក។

៤-៤-ការវិភាគលើខ្សែច្រវាក់តម្លៃ៖



៥-ហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈម

តាមការសិក្សាផ្ទាល់ជាមួយកសិករចិញ្ចឹមក្តាមថ្មីនៅខេត្តកំពត កសិករដែលមានបំណងប្រកបរបរចិញ្ចឹមក្តាមថ្មីត្រូវស្វែងយល់វិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមចម្បងៗមួយចំនួនទៅលើអាជីវកម្មរួមមានដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ការពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	ទីតាំងចិញ្ចឹមមានរបបទឹកជោរនាច ធ្វើឱ្យងាយរងនូវការបំពុល កំហាប់អំបិលប្រែប្រួលលឿន អាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ក្តាម។	- ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិបំប៉ន និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ឱ្យបានច្បាស់លាស់។ - មុនពេលបញ្ចេញ-បញ្ចូលទឹកត្រូវស្វែងយល់ពីស្ថានភាពបរិស្ថាន ស្ថានភាពជោរ-នាចនៃទឹកសមុទ្រ និងពិនិត្យគុណភាពទឹកជាមុន។

		កូនក្តាមពូជមិនល្អ មានផ្ទុកជំងឺ សុខភាពខ្សោយ នាំឱ្យការលូតលាស់យឺត និងមានអត្រាបាត់បង់ខ្ពស់ ។	- ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិកសិដ្ឋានផលិតកូនក្តាមពូជ - ណែនាំអ្នកនេសាទក្តាមធម្មជាតិអំពីការនេសាទដែលសមស្រប ការរក្សាទុក និងការដឹកជញ្ជូនកូនក្តាមឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ - កូនក្តាមត្រូវសម្លាប់មេរោគមុនពេលដាក់ចិញ្ចឹម
		ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំមិនបានដិតដល់នឹងបង្កឱ្យក្តាមមានសុខភាពមិនល្អ កើតជំងឺ ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងមានការបាត់បង់ខ្ពស់។	- ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក និងមានការផ្លាស់ប្តូរទឹកពី ២០-៣០% ជាប្រចាំ។ - ផ្តល់ចំណីគ្រប់គ្រាន់តាមបច្ចេកទេស មិនលើសមិនខ្វះ។ - មានកម្មវិធីបង្ការជំងឺ រក្សាលំនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមកម្ទាត់បាក់តេរី និងប៉ារ៉ាស៊ីត។ - តាមដានការលូតលាស់របស់ក្តាមជាប្រចាំ
២	ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ	ការចិញ្ចឹមទ្រង់ទ្រាយធំ អាជីវកម្មត្រូវមានទុនបម្រុងទុក សម្រាប់ទិញចំណី និងវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតចំណី ដែលមានការចំណាយខ្ពស់។	- ទោះជាជាការចិញ្ចឹមទ្រង់ទ្រាយតូចបំផុត ផែនការអាជីវកម្មត្រូវមានជាចាំបាច់។ - កសិករអាចអាចប្រមូលផលបណ្តាក់ដោយចាប់ក្តាមដែលមានទំហំស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារធ្វើជាទុនចិញ្ចឹមបន្ត។

៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មី មិនសូវមានការលំបាកនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីបច្ចេកទេសឱ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ត្រូវមានទីតាំងចិញ្ចឹមក្តាមសមស្រប ប្រភពកូនក្តាមពូជល្អ ការថែទាំ និងការគ្រប់គ្រងលើដំណើរការចិញ្ចឹមគឺជាកត្តាចម្បងដែលអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។ ថ្លៃដើមផលិតក្តាមថ្មីជាមធ្យម ១១,០៨៣រៀល/គ.ក បើលក់បានតម្លៃជាមធ្យម ៥០,០០០រៀល/គ.ក កសិករអាចទទួលបានចំណេញខ្ពស់រហូតដល់ ៣៨,៩១៧រៀល/គ.ក។ ការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មី កសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចចម្បងសំខាន់ៗមួយចំនួនមានដូចជា៖ ជ្រើសរើសទីតាំងឱ្យបានសមស្របពីព្រោះស្រះចិញ្ចឹមត្រូវការផ្លាស់ប្តូរទឹកជាប្រចាំ កូនក្តាមពូជត្រូវមានគុណភាពល្អ ថែទាំ-គ្រប់គ្រងស្រះចិញ្ចឹមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងអត្រាបាត់បង់។



ប្រភព និងឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

១- កសិករចិញ្ចឹមក្ដាមថ្ម នៅខេត្តកំពត

២- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្ដាមថ្ម តាមគេហទំព័រមួយចំនួនទាំងក្នុង និងក្រៅស្រុក៖

- <https://farmerdna.com/tips-in-starting-succesful-mud-crab-farming/>
- <https://www.facebook.com/watch/?v=906564893209496>
- <https://www.youtube.com/watch?v=pI1JXrLpXKs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=uV9VvWQVæI>
- <https://aquaculture.vn/khoa-hoc-ky-thuat/cua-bien-mot-so-benh-thuong-gap-va-bien-phap-phong-tri>
- <https://tepbac.com/technical/full/358-ky-thuat-nuoi-cua-thuong-pham-tu-giong-nhan-tao-trong-ao-dat-phan-2.htm>
- <https://thuysanvietnam.com.vn/phong-tri-benh-tren-cua-bien/>

