



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោល



រៀបចំដោយ

នាយកដ្ឋានគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦



023 220 811
023 220 810
095 416 878

16B, Street 7, Prek Leap Village, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Changva, Phnom Penh

មាតិកា

១- សេចក្តីផ្តើម	១
២- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម	១
២-១- ការជ្រើសរើសកូនទាតគីរឈ្មោល.....	១
២-២- ការរៀបចំទីជម្រកទាតគីរឈ្មោល.....	២
២-៣- ការថែទាំកូនទាតគីរឈ្មោល.....	៤
២-៤- ចំណី និងទឹកសម្រាប់ទាតគីរឈ្មោល.....	៥
៣- ជីវិត ការការពារ និងការថែរក្សាសុខភាពទាតគីរឈ្មោល	៦
៣-១- ជំងឺផ្តាសាយបក្សី.....	៦
៣-២- ជំងឺប៉េស្តូទា.....	៦
៣-៣- ជំងឺអាសន្នរោគ.....	៧
៣-៤- ជំងឺរលាកថ្លើមបង្កដោយវីរុសចំពោះទា.....	៨
៤- តម្លៃ និងទីផ្សារ	៩
៤-១- តម្លៃ.....	៩
៤-២- ទីផ្សារ.....	៩
៤-៣- គម្រោងនៃការចំណាយលើការចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោលចំនួន ៣,៣០០ក្បាល/វគ្គ.....	៩
៤-៤- ការប្រមូលផលទាតគីរឈ្មោល	៩
៥- ការវិនិច្ឆ័យសេដ្ឋកិច្ច	៩
៥-១- ការវិភាគលើតម្លៃលក់ទាតគីរឈ្មោលសាច់អាយុ២ខែ	១១
៥-២- ការវិភាគទៅលើអត្រាបាត់បង់.....	១១
៦- ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍	១២
៧- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	១៣

១- សេចក្តីផ្តើម

ទា “គគីរ” គឺជាពូជទាមានរោមសម្បុរគគីរដែលប្រជាជនយើងនិយមហៅថា ទា “កាប” គឺជាពូជទាចិញ្ចឹមយកស្ថិតសម្រាប់ទាញីព្រោះជាពូជទាដែលផ្តល់ស្ថិតច្រើនជាងពូជទាដទៃ រីឯទាគគីរឈ្មោលគឺចិញ្ចឹមបំប៉នជាទាសាច់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារដូចជា អាំង ខ្មែ...ជាដើម ដែលមានសារធាតុខ្លាញ់តិច ជាតម្រូវការសម្រាប់អ្នកពុំចូលចិត្តខ្លាញ់ច្រើន។ ទាគគីរឈ្មោល ចិញ្ចឹមឆាប់ធំធាត់ដោយអាចប្រមូលផលក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពី ៧០ ទៅ ៨០ថ្ងៃ។ ការចិញ្ចឹមទាគគីរឈ្មោល គឺងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់ចំណី ធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុបានល្អ។ ដើម្បីចិញ្ចឹមទាគគីរឈ្មោលទទួលបានជោគជ័យ និងទិន្នផលខ្ពស់ ទាមទារឱ្យកសិករត្រូវគិតគូរពីការជ្រើសរើសកូនទាពូជ របៀបថែទាំសុខភាព ជ្រើសរើសចំណីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ របៀបផ្តល់ចំណីទៅតាមដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់ទា ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ វ៉ាក់សាំង និងទីផ្ទាល់ចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈសមស្រប។

២- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

២-១-ការជ្រើសរើសកូនទាគគីរឈ្មោល

ក)- លក្ខណៈសម្គាល់ភិនភាគរបស់កូនទាគគីរឈ្មោលមាន÷

រោមពណ៌គគីរក្រមៅពេលនៅតូច និងប្តូរជាពណ៌គគីរស្កូវនៅពេលធំឡើង មានកូនលិង្គតូចមួយនៅក្នុងរន្ធកូន ចំពុះ និងជើងមានពណ៌ខ្មៅ មានដងខ្លួនវែង កវែង និងមូល ហើយមានអាកប្បកិរិយាស្ងប់ស្ងាត់សម្លេងធំ។



ទាឈ្មោល



ទាញី

ខ)- កត្តាសំខាន់ៗនៃការជ្រើសរើសកូនទាគគីរឈ្មោល ÷

- មានប្រភពច្បាស់លាស់ពីកន្លែងភ្ជាប់កូនទាត្រឹមត្រូវ
- ជាកូនទាគគីរឈ្មោលសុខភាពល្អ សល់ពីការរើសកូនទាញីចេញក្នុងតម្លៃខ្ពស់

- ជ្រើសរើសយកកូនទាមានដងខ្លួនវែង ងើបត្រង់ និងទងធ្មិចស្អាត
 - មានរោមរាបជាប់ស្បែកភ្លឺរលោង និងភ្នែកភ្លឺថ្លា ដើរមានទ្រង់ទ្រាយល្អ មិនមានស្នាមរបួស
 - ពូកែស៊ីចំណី ជីកទឹក មានសុខភាពល្អ និងមិនមានជំងឺ ឬមិនធ្លាប់កើតជំងឺឆ្លង
- ទាគតិរណ្ណាលអាយុ ២,៥ខែ អាចមានទម្ងន់ចន្លោះពី ០,៩ទៅ ១,១គីឡូក្រាម/ក្បាល។



២-២-ការរៀបចំវិធីប្រកាសទាគតិរណ្ណាល

ក)- មានប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

- មានសុវត្ថិភាពការពារពីសត្វកាចសាហាវផ្សេងៗ
- កាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺពីខាងក្រៅ
- ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង (ការផ្តល់ចំណី ការផ្តល់ភ្នាក់ងារសំងាត់...)
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផល

ខ)- ការសាងសង់រោងទា និងរៀបចំអនាម័យរោងទា៖

- សង់រោងទាពីសម្ភារៈងាយស្រួលរក
- រោងត្រូវបានធានាថាស្អាត សម្លាប់មេរោគ និងទុកចោលតិចបំផុត ១៤ ថ្ងៃ
- ស្ទូកទឹក ស្ទូកចំណី ត្រូវបានធានាឱ្យស្អាត និងស្ងួត
- ប្រើចំបើង ឬអង្កាមស្អាត ហើយទន់ ដើម្បីទ្រាប់
- រោងត្រូវមានខ្យល់ចេញចូល តែចៀសវាងខ្យល់ត្រជាក់ប៉ះចំទាផ្ទាល់
- រោងត្រូវតែកម្ដៅមុនពេលចូលកូនទា
- ត្រូវតែបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគមុនពេលចូលកូនទា
- អង្កាម ត្រូវតែថ្មី បានរំងាប់មេរោគជាស្រេច ចំហុយមុន ៣ថ្ងៃចូលកូនទា
- ដាក់អង្កាមកម្រាស់ពី ៧-៨ស.ម

-ទីតាំងស្រួលថែទាំ ទូលាយ ដីមិនស្អិត មិនដក់ទឹក និងមិនមានទឹកហូរឆ្លងកាត់



គ)- ការរៀបចំអាងទឹកសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ទាតគីរឈ្មោល

ករណីកន្លែងចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោលមិនមានត្រពាំងឬស្រះទឹកនោះ កសិករត្រូវតែរៀបចំអាងទឹក ដោយប្រើកៅស៊ូតង់សម្រាប់រៀបចំជាអាងទឹក ឬធ្វើអាងស៊ីម៉ង់ត៍មានរន្ធសម្រាប់បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកឱ្យទាលេង



និងសម្រាប់លាងសម្អាតខ្លួនជាប្រចាំ ផ្ទៃបាតស្រះធ្វើរាងជម្រាលមុំ ៤៥ដឺក្រេ។ អ្នកចិញ្ចឹមទាតគីរផ្លាស់ប្តូរទឹក អាងចេញពី ១ទៅ ២ដង/ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើភាពកក់រលួយនៃទឹក និងមិនត្រូវឱ្យទាលេងទឹកដែលមានកម្ដៅក្ដៅ នោះទេ ។

២-៣-ការថែទាំកូនទាតគីរឈ្មោល

- កូនទាតគីរឈ្មោលទើបញាស់ត្រូវការផ្តល់ទឹក ចំណី និងមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អ
- កូនទាតគីររក្សានៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទៅតាមអាយុកាល ដែលចន្លោះពី ២៤ទៅ ៣៥អង្សាសេ
- កូនទាតគីរចិញ្ចឹមកន្លែងមានសុវត្ថិភាព មិនមានសត្វកាចសាហាវ ឬសត្វផ្សេងៗមកបំផ្លាញ

- កូនទាអាយុក្រោម ៣ថ្ងៃ មិនត្រូវឱ្យទាប៉ះពាល់ទឹកឡើយ
- មិនត្រូវឱ្យកូនទានៅក្រោមទឹកភ្លៀងទេ ព្រោះកូនទាពុំអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បាន
- ដាក់កូនទាក្នុងទីធ្លាចិញ្ចឹម និងកន្លែងដេកស្របទៅតាមមាឌ អាយុ និងទំហំដងខ្លួន
- នៅរដូវវស្សា គួរកម្តៅទារយៈពេល ៣-៤សប្តាហ៍ និងរដូវក្ដៅ គួរកម្តៅទារយៈពេល ១ទៅ២សប្តាហ៍



ដងស៊ីតេដាក់ទាចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុង៖

អាយុទាគីរល្មោល (សប្តាហ៍)	ដងស៊ីតេ (ក្បាល)/ម៉ែត្រការ៉េ
អាយុក្រោម ១សប្តាហ៍	២០ - ៣០
អាយុចន្លោះពី ១ ទៅ៤សប្តាហ៍	១០ - ២០
អាយុចាប់ពី ៤សប្តាហ៍ឡើង	៣ - ៥

២-៤-ចំណី និងទឹកសម្រាប់ទាគីរល្មោល

កូនទាចាប់ផ្តើមស៊ីចំណីក្រោយពេលញាស់ ហើយនឹងធំឆាប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីលូតលាស់ ធំឆាប់ ទាត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗដូចជា៖ ទឹក ប្រូតេអ៊ីន ថាមពល វីតាមីន និងសារធាតុដុំ ដែលមាននៅក្នុង បន្លែបៃតង គ្រាប់ធញ្ញជាតិ សំបកក្តាមខ្យង ខ្នុរ ដង្កូវ និងសត្វល្អិតផ្សេងៗ។ល។

កម្រិតប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ទាសាវល្មោលអាស្រ័យទៅតាមអាយុរបស់ទា មានដូចខាងក្រោម៖

- កូនទាអាយុពី ១ថ្ងៃទៅ ៣សប្តាហ៍ត្រូវការកម្រិតប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ពី ២០ទៅ ២២%ដើម្បីចិញ្ចឹម សារពាង្គកាយ និងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
- ការផ្តល់ចំណីដល់កូនទាគីរល្មោលតូចៗត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូនទាញាស់បាន ២៤ម៉ោង

- ផ្តល់ចំណីដល់កូនទា ៤-៥ដង/ថ្ងៃ
- លាយចំណីផ្សំឱ្យបានច្រើនមុខ
- បន្ថែមប្រូតេអ៊ីនដូចជាត្រីតូចៗ ឬជន្លេនកាត់តូចៗ ធ្វើឱ្យកូនទាឆាប់ធំធាត់លឿន
- បន្ថែមកូនក្តាម ខ្យង ជាប្រភពប្រាំង និងផ្តល់បន្ថែមប្រាំងដូចជាត្រីកូន ឬចកបាយទា ជាប្រភពវីតាមីន
- កូនទាចូលចិត្តចំណីសើម ដូចជាចកបាយទា ដែលអាចស៊ីស្មើនឹងទម្ងន់វា
- ក្រោយពេលឱ្យចំណីរួចត្រូវដាក់កូនទាទៅក្នុងធានីដែលមានទឹក ១-១.៥ ស.ម ក្រោយពីឱ្យវាលេងទឹកសម្អាតខ្លួនរួច ដាក់ពួកវាទៅលើកម្រាលស្អាត ឬកម្រាលអង្កាមដើម្បីសម្អាតពួកវា មុននឹងដាក់វាចូលទៅក្នុងរោង ឬទ្រុងដើមវិញ។

តម្រូវការទឹក ៖

ទឹកមានសារៈសំខាន់ចូលរួមជួយដំណើរការលូតលាស់ ធ្វើឱ្យចំណីទន់ និងជួយដល់ការរំលាយអាហារ ការស្រូប និងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមទៅគ្រប់សរីរាង្គ។

- ប្រើទឹកដែលមានលាយថ្នាំ ដូចជា៖ Glucose ចំនួន ៥ក្រាម +Vitamin C10% ចំនួន ២ក្រាម +Electrolyte ចំនួន ២ក្រាម លាយទឹក ចំនួន ១លីត្រ
- ដាក់ស្លឹកទឹកឱ្យនៅក្បែរទា ត្រូវសង្កេតមើលចំពោះកូនទាណា ដែលមិនបានទៅក្បែរស្លឹកទឹក
- ទឹកផឹកត្រូវពេញស្លឹកល្អ ហើយត្រូវឱ្យស្លឹកផ្លាស់ប្តូរទឹកស្អាត ដើម្បីឱ្យទាផឹកទឹកឆ្អិនដែលបានកម្ដៅក្នុងសីតុណ្ហភាព ១៨-២០ អង្សាសេ ក្នុងចំនួនគ្រប់គ្រាន់។

ចំណាំ៖ ទាផឹកទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្តាលឱ្យស៊ីចំណីបានតិច ធំធាត់យឺតៗ។

៣- ជីវិត ការការពារ និងការថែរក្សាសុខភាពទាគីរល្មោល

ការចិញ្ចឹមកូនទាតែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់នូវជំងឺមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

៣-១-ជីវិតសាយបក្សី

អាចកើតមានឡើងលើទាគ្រប់វ័យ

រោគសញ្ញា៖

- ទាមានអត្រាងាប់ខ្ពស់ ងាប់លឿន (រោគសញ្ញា ឬស្លាកស្នាមមិនអាចកើតមាន)
- មានសភាពងងុយដេក ក្បាលសំយុងចុះប៉ះដី
- ភ្នែកឡើងស ត្របកភ្នែកហើម
- លាមករាតពណ៌ស

ចំណាំ៖ ជំងឺជាសាយបក្សីពុំអាចព្យាបាលបាននោះទេ

វិធីសាស្ត្រការពារ ៖

- កសិករត្រូវអនុវត្តវិធានការជីវសុវត្ថិភាពចំពោះហ្វូងទា
- បង្កាច់បក្សីដែលនាំមកជូននៅដាច់ដោយឡែក មុនពេលដាក់ចូលក្នុងហ្វូង
- ទាអាចផ្គុំជំងឺយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ និងឆ្លងទៅបក្សីក្នុងភូមិ បណ្តាលឱ្យផ្ទុះជំងឺ
- ប្រើសំណាញ់ព័ន្ធជុំវិញ ដើម្បីចៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយបក្សីព្រៃ
- វិរុសឆ្លងតាមរយៈស្បែកជើង សម្លៀកបំពាក់ និងដៃ ដូច្នេះកសិករត្រូវលាងដៃ ឬសម្លៀកបំពាក់ និងសម្អាតស្បែកជើងជាមួយសាប៊ូមុនចូលទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម ដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគ។

៣-២-ជំងឺប៉េស្តូទា

ជំងឺនេះបណ្តាលមកពីវិរុស មេរោគនៃជំងឺប៉េស្តូចូលចិត្តរស់នៅក្នុងពោះវៀន និងកន្សោមពង ឬឯខាងក្រៅខ្លួនសត្វ វាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹក។

រោគសញ្ញា៖

- រយៈពេលបង្កជំងឺពី ២ទៅ១០ថ្ងៃ លើទាគ្រប់វ័យ
- អត្រាស្លាប់មានដល់ ១០០%
- ទាដែលមានវ័យចាស់ងាយទទួលជំងឺខ្លាំងជាងទាក្មេង
- ទាសំបុកដេកផ្ទាល់នឹងដីមិនសូវធ្វើចលនា ធ្លាក់ស្លាប់មានសំបោរចេញពីច្រមុះ រង្វង់ភ្នែកក្រហមជាំ
- រាគ លាមកមានសណ្ឋានជាទឹក ឬរាគឈាម រោមមានប្រឡាក់ដី ឬឈាម
- ទាស្រេកទឹកខ្លាំង ទាច្រើនស្លាប់ដោយរមួលក្រោយ ឬទៅចំហៀងខ្លួន។

ការឆ្លងរាលដាល៖

- វិរុសនៃជំងឺប៉េស្តូទាចេញពីដងខ្លួនសត្វមកក្រៅតាមលាមក ឬសារធាតុរាវផ្សេងៗចេញពីខ្លួនសត្វ ឈឺ ឬស្លាប់ ចូលក្នុងទឹក ចំណី ដែលបណ្តាលឱ្យឆ្លងទៅទាផ្សេងៗ និងសត្វកកេរដទៃទៀតនាំឱ្យមេរោគបង្កជំងឺពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ។

វិធីសាស្ត្រការពារ និងព្យាបាល៖

- ពុំមានថ្នាំព្យាបាលទេ ព្រោះជំងឺនេះបណ្តាលមកពីវិរុស
- ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប៉េស្តូទា
- ទិញកូនទាពីកន្លែងដែលគ្មានជំងឺ មានអនាម័យឡឆ្ងាស់ និងមេបាមានកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវ
- អនាម័យ (លាងសម្អាតស្លកទឹក ស្លកចំណី) ហាមសត្វបក្សីផ្សេងៗចូលក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមទា។

៣-៣-ជំងឺអាសន្នរោគ

ជាជំងឺបង្កឡើងដោយបាក់តេរី អត្រាស្លាប់ខ្ពស់ បង្ករោគលក្ខណៈមធ្យម ស្រួចស្រាវ និងស្រួចស្រាវខ្លាំង កើតឡើងលើទាត្រប់វ័យទាំងអស់

រោគសញ្ញា៖

- ដំណើរលឿយៗ និងខ្សោយកម្លាំង
- មិនសូវស៊ីចំណី ស្រេកទឹកខ្លាំង
- ទាត្រូវីក្បាលញឹកញាប់ និងរាគពណ៌លឿងខ្ចីលាយជាមួយទឹក
- ភ្នែកសើម និងច្រមុះមានស្នេស
- អត្រាបាត់បង់ចន្លោះពី ៥% ទៅ ៣៥% ឆ្លងរហ័សតាមរយៈស្នេស និងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់រវាងទាឈី និងទាជារស់នៅក្នុងហ្វូងតែមួយ

វិធីសាស្ត្រការពារ និងព្យាបាល ៖


- ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺអាសន្នរោគ(ចាក់សាច់ដុំទ្រូងឬសើរស្បែក) លើកូនទាអាយុ ២ ទៅ ៣ សប្តាហ៍
- ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ ដោយសារមេរោគវីរុសរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

៣-៤-ជំងឺលាកថ្លើមបង្កដោយវីរុសចំពោះទា

រលាកថ្លើមទា គឺជំងឺបង្កឡើងដោយវីរុសស្រួចស្រាវបំផុតលើកូនទាអាយុក្រោម ១ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុសនេះមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ដល់ ៨០-៩៥% និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះទាអាយុ៤សប្តាហ៍ចុះក្រោម។

រោគសញ្ញានៃជំងឺ៖

- ច្រើនកើតឡើងចំពោះកូនទា អាយុ ៤ សប្តាហ៍ចុះក្រោម
- កូនទាអាយុក្រោម ១ សប្តាហ៍មានអត្រាស្លាប់រហូតដល់ ៩៥%
- កូនទាដេកចំហៀងខ្លួន ហើយប្រកាច់ទំពាក់ជើងទាំង២
- សន្លឹម មិនស៊ីចំណី ញ័រ ដួលផ្ទុះរក្សាលទៅក្រោយ និងស្លាប់ដោយបត់ក្បាលទៅក្រោយ



ការការពារ

- ចាក់វ៉ាក់សាំងតាមកម្មវិធី និងទិញកូនទាពីហ្វូងមេបាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង
- កូនទា (Ducklings): បើមានអង្គទីគំរើកំណើតខ្ពស់ ចាក់នៅអាយុ ១ទៅ៧ថ្ងៃ បើតំបន់ផ្ទះជីវ្ហាង អាចចាក់ថ្ងៃទី១។

ការព្យាបាលគាំទ្រសុខភាពទាទៅតាមរោគសញ្ញារួមមាន៖

- ផ្តល់ទឹក លាយអេឡិចត្រូលីត (Electrolytes) ដើម្បីបង្ការការខ្វះជាតិទឹក
- ផ្តល់ថាមពល ដូចជាគ្លុយកូស (Glucose)
- ផ្តល់វីតាមីន Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E និង Vitamin C ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសុំ
- រក្សាសីតុណ្ហភាពបរិស្ថានឱ្យសមស្រប និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង (stress)
- ប្រើអង្គទីបីយ៉ូទិក (Antibiotics) នៅពេលមានការឆ្លងបាក់តេរីឱកាសនិយម (secondary bacterial infection) តែត្រូវចាំថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើវីរុសទេ។

៤-តម្លៃ និងទីផ្សារ

៤-១-តម្លៃ៖ ឈ្នួញប្រមូលទិញទាគីរណ្ណាលក្នុងតម្លៃបោះដុំពី ៧,០០០ ទៅ ១០,០០០រៀល/គ.ក្រ។

៤-២-ទីផ្សារ៖ កសិករអាចលក់ទាគីរណ្ណាលរស់ទៅឈ្នួញកណ្តាល ឬអ្នកលក់ទាអាំងផ្ទាល់ដែលមកយកដល់កសិដ្ឋាន។

៤-៣-គម្រោងនៃការចំណាយលើការចិញ្ចឹមទាគីរណ្ណាលចំនួន ៣,៣៣០ក្បាល/វគ្គ

គម្រោងចិញ្ចឹមទាគីរណ្ណាលនេះត្រូវបានក្រុមការងារចុះសិក្សានៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាគីរណ្ណាលនៅឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត។

- ទំហំផ្ទៃកសិដ្ឋានសរុប៖ ០,៣ហិកតា

- ចំនួនវគ្គ/ឆ្នាំ៖ ៤វគ្គ/ឆ្នាំ (១វគ្គប្រើរយៈពេល ៧០ទៅ៨០ថ្ងៃនិងទុកទ្រុងឱ្យទំនេរ ១០ទៅ ២០ថ្ងៃដើម្បីសម្អាត បាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ)

- ទំហំទ្រុង៖ ទទឹង១០ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ៦០ម៉ែត្រ

- ទុនចំណាយពេលចាប់ផ្តើម៖ ២៦,៧៦១,៥៦៩រៀល ក្នុងនោះរួមមាន៖

ចំណាយវិនិយោគលើការរៀបចំរោងទា សំណាញ់ និងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ (ជាដុល្លារ)	ចំណាយលើការចិញ្ចឹម-ថែទាំ ពូជ ចំណី និងថ្នាំ (ជាដុល្លារ)	ចំណាយសរុប (ជាដុល្លារ)
4,511,000	22,250,569	26,761,569

៤-៤-ការប្រមូលផលទាគគីរឈ្មោល៖

ដោយផ្អែកលើនិន្នាការតម្លៃ និងអត្រាស្លាប់កូនទាអាយុក្រោម១សប្តាហ៍ពី ៥ ទៅ១៥%

- ទាគគីរឈ្មោលសាច់អាចមានទម្ងន់ពី ០,៩ទៅ ១,១គ.ក្រ/ក្បាល (ជាមធ្យមទម្ងន់ទាគគីរឈ្មោលសាច់ ១គ.ក្រ/ក្បាលសម្រាប់ការចិញ្ចឹមរយៈពេល ៧៥ថ្ងៃ ឬ ២,៥ខែ)
- អត្រាបាត់បង់មធ្យមអាចចន្លោះពី ៥%ទៅដល់១៥% គឺអាស្រ័យលើការថែទាំ ចំណី ទឹក និងពូជ
- តាមរយៈការសិក្សា កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាគគីរឈ្មោលមានអត្រាបាត់បង់ ១០% នៃចំនួនទាសរុប

៥-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច

លើការចិញ្ចឹមទាគគីរឈ្មោលចំនួន ៣,៣៣០ក្បាល/វគ្គ ទម្ងន់ជាមធ្យម ១គ.ក្រ/ក្បាល តម្លៃជាមធ្យម ៨,៥០០ដុល្លារ/ក្បាល។

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់ សរុប (។)	ចំនួនសារ រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប (។)
១-ចំណូលសរុប/(២,៥ខែ)						25,474,500
ចំណូលពីការលក់ទាគគីរឈ្មោល	ក្បាល	2,997	8,500	25,474,500		25,474,500
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ						22,426,819
២.ក.ចំណាយប្រែប្រួល						22,250,569
កូនទាគគីរឈ្មោល	ក្បាល	3,330	500	1,665,000		1,665,000
ចំណីកូនទា	គ.ក្រ	7,340	2,093	15,365,669		15,365,669
ស្រូវ	គ.ក្រ	2,850	1,000	2,850,000		2,850,000
ថ្លៃអគ្គីសនី	គី.វ៉ាត់	30	730	21,900		21,900
ថ្នាំ និងវិភាគ	គ.ក្រ	10	25,000	250,000		250,000
វ៉ាក់សាំងប៉េស្តូទា	ដប	3	50,000	150,000		150,000

វ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគ	ដប	1.5	180,000	270,000		270,000
កម្លាំងពលកម្ម	ខែ	2,5	640,000	1,600,000		1,600,000
ថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិត	កញ្ចប់	1	30,000	30,000		30,000
ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ	ដប	2	24,000	48,000		48,000
២.១.ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ (ក្នុង២,៥ខែ)				4,511,000		176,250
រោងទាតគីរឈ្មោល(ទទឹង១០ម៉ែត្រ បណ្តោយ៦០ម៉ែត្រ)	រោង	1	4,000,000	4,000,000	40	100,000
សំណាញ់ព័ន្ធជុំវិញបរិមាណទ្រុង	គ.ក្រ	5	25,000	125,000	30	4,167
កម្រាល(ចំបើង និងអង្កាម)	ដុំ	7	3,000	21,000	1	21,000
ស្លកទឹក	ចំនួន	4	80,000	320,000	30	10,667
ស្លកចំណី	ចំនួន	10	500	5,000	12	417
អំពូលកម្ដៅ	ចំនួន	10	4,000	40,000	1	40,000
៣-ចំណេញសរុប						3,047,682
ថ្លៃដើមសរុបទាតគីរឈ្មោល ១ក្បាល= ចំណាយសរុប/ចំនួនទាតគីរឈ្មោលសរុប						7,483
ចំណេញលើទាតគីរឈ្មោល ១ក្បាល= តម្លៃលក់ចេញ-តម្លៃដើមក្នុង១ក្បាល						1,017

៥-១-ការវិភាគលើតម្លៃលក់ទាតគីរឈ្មោលសាច់អាយុ២,៥ខែ ដោយផ្អែកលើនិទ្ទាភាគតម្លៃ៖

- ចន្លោះពីខែកុម្ភៈ ដល់ ខែមេសា តម្លៃជាមធ្យម ៩,៥០០ រៀល/ក្បាល
- ចន្លោះពីខែឧសភា ដល់ ខែមិថុនា តម្លៃជាមធ្យម ៨,០០០ រៀល/ក្បាល
- ចន្លោះពីខែកក្កដា ដល់ ខែមករា តម្លៃជាមធ្យម ៨,៥០០ រៀល/ក្បាល

ចំនួនទាតគីរឈ្មោល	តម្លៃ/ក្បាល	ចំណូលសរុប	ចំណាយសរុប	ចំណេញសរុប	ភាគរយ
2,997	8,000	23,976,000	22,426,819	1,549,182	6.91%
2,997	8,500	25,474,500	22,426,819	3,047,682	13.59%
2,997	9,500	28,471,500	22,426,819	6,044,682	26.95%

៥-២-ការវិភាគនៅលើអត្រាបាត់បង់(៥%ដល់ ៣៥%)

អត្រា បាត់បង់(%)	ចំនួន(ក្ប)	ចំនួន បាត់បង់(ក្ប)	ចំនួនទា សល់(ក្ប)	តម្លៃ/ក្ប(៛)	ចំណូល សរុប(៛)	ចំណាយ សរុប(៛)	ចំណេញ សរុប(៛)
5%	3,330	167	3,164	8,500	26,889,750	22,426,819	4,462,932
10%	3,330	333	2,997	8,500	25,474,500	22,426,819	3,047,682
15%	3,330	500	2,831	8,500	24,059,250	22,426,819	1,632,432
20%	3,330	666	2,664	8,500	22,644,000	22,426,819	217,182
25%	3,330	833	2,498	8,500	21,228,750	22,426,819	1,198,069
30%	3,330	999	2,331	8,500	19,813,500	22,426,819	2,613,319
35%	3,330	1,166	2,165	8,500	18,398,250	22,426,819	4,028,569

៦-ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍៖

តាមរយៈនៃការចុះស្វែងយល់ដល់កសិដ្ឋាន កសិករចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោល អាចជួបប្រទះហានិភ័យ មួយចំនួនជាយថាហេតុលើដំណើរការចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោល ដែលនាំឱ្យបង្កផលវិបាក និងប៉ះពាល់ដល់ សមត្ថភាពផលិតកម្ម ដូចនេះកសិករគួររៀបចំផែនការជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ហានិភ័យទាំងនោះរួមមាន៖

ល.រ	ប្រភេទ ហានិភ័យ	ការពិពណ៌នា ពីហានិភ័យ	វិធានការ និងអនុសាសន៍
១	ហានិភ័យ ផលិតកម្ម	កូនទាតគីរដែល មានជំងឺតូចពី មេបា និងកូនទា តគីរឈ្មោលដែល មានសុខភាព ខ្សោយដឹកជញ្ជូន យូរពេក	- សិក្សាពីប្រវត្តិកសិដ្ឋានលក់ពូជឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមេបាពូជ - ត្រូវបរិសុទ្ធកូនទាតគីរឈ្មោលដែលមានសុខភាពល្អមានទំហំប៉ុនៗ គ្នា មានឈាមភ្លឺរលោង មិនស្ងួតជើង - សន្ទាក់ជើងល្អ ដំណើររហ័សរហួន ជៀសវាងពូជជាន់ឈាម - មានកែវភ្នែកភ្លឺថ្លា - តាមដានទម្ងន់មេបា និងប្រវត្តិដើមនៃការបង្កាត់ពូជ

		កង្វះខាតទីផ្ទារ ពុំ មានស្រះទឹក សម្រាប់ទាញទឹក លេង និងខ្វះទឹក ស្អាតសម្រាប់ផឹក	- មានទំហំសមាមាត្រនឹងចំនួនទាតគីរឈ្មោល - មានរៀបចំស្រះទឹកសម្រាប់កូនទាញទឹកលេង - មានទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំ - រៀបចំកម្រាលទ្រុងស្អាត ពិសេសពេលកូនទាញទឹក - ផ្តល់កម្ដៅឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	តម្លៃទីផ្សារទាតគីរ សាច់ប្រែប្រួល មិនច្បាស់លាស់	- ស្វែងរកទីផ្សារ ឬឈ្នួញប្រមូលទិញឱ្យបានច្រើន - ស្វែងរកហាង ភោជនីយដ្ឋានដែលមានតម្រូវការជាប្រចាំ និង លទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់លាស់ - រកទីផ្សារលក់រាយក្នុងតំបន់ទៅអ្នកបរិភោគផ្ទាល់
៣	ហានិភ័យ ហិរញ្ញវត្ថុ	ខ្វះថវិកានៅក្នុង ដំណើរការចិញ្ចឹម ពេលខ្វះត្រូវបង្ខំ ចិត្តលក់ទាំងទាត់ ទាន់គ្រប់ទម្ងន់	- មានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ - មានទុនបម្រុងក្រៅពីទុនវិនិយោគ - ត្រូវរកទុនឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ - កំណត់បរិមាណទាត់ដែលត្រូវចិញ្ចឹមទៅតាមទំហំទុន - ដាក់ទាតគីរឈ្មោលចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងនូវបរិមាណសមស្រប ដោយ ដាក់ចិញ្ចឹមវិលជុំ
៤	ហានិភ័យ បរិស្ថាន	មានក្លិនស្អុយ សាយភាយទៅអ្នក រស់នៅជិតខាង	- ត្រូវចិញ្ចឹមនៅក្នុងចម្ការ ឬឆ្ងាយពីផ្ទះប្រជាជនរស់នៅ - ត្រូវធ្វើអនាម័យជាប្រចាំ និងរៀបចំប្រព័ន្ធដីវសុវត្ថិភាព

៧-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ទាតគីរឈ្មោលងាយស្រួលចិញ្ចឹម មិនរើសចំណី ធំធាត់លឿន ធន់ខ្លាំងទៅនឹងអាកាសធាតុ មានទីផ្សារល្អនៅរដូវបុណ្យទាន ពិសេសចន្លោះពីខែមករា ដល់ខែមេសា។ តាមការចុះសិក្សាជាក់ស្តែងការចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោលរបស់កសិករនៅខេត្តកំពត ចំនួន ៣,៣៣០ក្បាល ដោយប្រើពេល២,៥ខែ/វគ្គ ទទួលបានទម្ងន់ជាមធ្យម ១គ.ក្រ/ក្បាល ស្មើនឹង ២,៩៩៧ក្បាល (អត្រាបាត់បង់ ១០%) ដោយចំណាយថ្លៃដើមផលិត ៧,៤៨៣រៀល/ក្បាល ទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ ១,០១៧រៀល/ក្បាល។ ក្នុង ១វគ្គកសិករអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាង ៣លានរៀល សម្រាប់តម្លៃទូទៅ និងរដូវកាលចូលឆ្នាំចិន ឬបុណ្យទានធំៗ កសិករអាចលក់ចេញក្នុងតម្លៃ ៩,៥០០រៀល/ក្បាល ដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ជាង ៦លានរៀល/វគ្គ ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើអត្រាបាត់បង់ និងតម្លៃលក់លើទីផ្សារ។ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន កសិករគួរគិតគូរលើកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដូចជា ការជ្រើសរើសកូនទាត់ ការថែទាំដោយធ្វើ

អនាម័យស្លកទឹក ចំណី និងអាងទឹកសម្រាប់ទាចុះសម្អាតខ្លួន គុណភាពចំណីសមស្របនឹងតម្លៃ ធ្វើកម្មវិធីវ៉ាក់ សាំងឱ្យបានទៀងទាត់ និងមានទីផ្សារបោះដុំច្បាស់លាស់។



ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

- ១/ កសិករចិញ្ចឹមទាតគីរឈ្មោលនៅឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត
- ២/ បទពិសោធន៍ជោគជ័យលើមុខរបរចិញ្ចឹមទា (នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)
- ៣/ វិធីសាស្ត្រផ្តល់ចំណីទាយកស៊ីតរបស់ក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វ ឆ្នាំ ២០១៦
- ៤/ ការចិញ្ចឹម និងគ្រប់គ្រងទានៅជនបទ (នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម)

